



ПЕРВИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ ВИЧ



Под «первичной инфекцией (также называемой острой или прима-инфекция) подразумеваются первые 6 месяцев с момента, в который ВИЧ входит в организм.

01

Что происходит во время первичной инфекции?



В начале ВИЧ начинает воспроизводиться бесконтрольно, доходя до уровней очень высоких уровней вирусного присутствия (количество вируса в крови).

Со временем организм начинает откликаться на инфекцию и производит антитела, которые уменьшают вирусное присутствие.

02

СИМПТОМЫ ПЕРВИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ

Эти симптомы появляются с задержкой на несколько дней или недель с момента заражения вирусом, и могут дать задержку до 2 недель. Поэтому многие люди не замечают ничего во время этой фазы. В целом, симптомы не определенные, и их можно спутать с гриппом и другими распространенными инфекционными заболеваниями. Самые распространенные симптомы - это температура, воспаленные железы, сыпь на коже, гнойнички и язвы во рту и / или в горле, боль в мышцах или суставах.

ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ ОСТРОЙ ИНФЕКЦИИ ВИЧ



03

ЛЕЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРВИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ

Многие исследования отмечают, что начало лечения во время этой фазы может иметь благоприятные последствия для здоровья в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Однако для многих людей может быть сложным принимать решение так быстро, после первого диагноза.



GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA
DE LA SIDA



FOR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



ETIS
SIEMPRE PRESENTE EN
INMIGRACIÓ I SALUT



TROPICAL
DRAGAGEES



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org