

SEXUL ORAL ȘI HIV



Sexul oral este o practică care, în general tinde să includă un risc mic de transmitere a HIV, deși există mai mulți factori care pot să determine ca riscul să fie mai mare sau mai mic.

01 FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ ASUPRA RISCULUI DE TRANSMITERE

- Indiferent de alți factori, atunci când persoana cu HIV urmează tratamentul antiretroviral reduce încărcătura virală și riscul de transmitere al virusului poate fi redus foarte mult.
- Deși este o relație care poartă un risc scăzut, acesta poate fi redus și mai mult prin folosirea preservativelor.
- În cazul în care persoana cu HIV practică sexul oral, riscul de transmitere al virusului la parteneră/ului său este foarte scăzut, deoarece virusul nu se transmite prin salivă.
- În cazul unei femei cu HIV care primește sexul oral, riscul de transmitere este foarte scăzut. Dar, acest risc poate crește în timpul menstruației, deoarece virusul poate ajunge în contact cu sângele.
- Dacă este bărbatul HIV-pozitiv și ejaculează în gura partenerii/lui, riscul este mai mare, deoarece semenul conține concentrații mari ale virusului, mai ales atunci când nu se urmează tratamentul.
- Când persoana care practică sexul oral nu are HIV dar prezintă tăieturi sau răni în gură, sau îi sângerează gingiile este mai expusă riscului de a se contagia cu HIV decât atunci când menține o bună sănătate bucală.

Există unele controverse privind faptul dacă lichidul preseminal a unui bărbat cu HIV poate transmite virusul. În general, riscul este mai mic, deoarece este produs în cantități mai mici, dar este, de asemenea, legată de alți factori, cum ar fi încărcătura virală.



GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA
DE LA SIDA



FOR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Ajuntament de Barcelona

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



ETIS
SERVICIO FEDERAL DE
INMIGRACIÓN I SALUT



RISC
CRESCUT

- Efectuarea sexului oral unei persoane cu HIV.
- Primiți ejaculare în gură.
- Răni sau tăieturi în gură, sau sângerea gingiilor.
- Încărcătura virală mare.

RISC
SCĂZUT

- Primirea sexului oral de la o persoană cu HIV
- Nu primiți ejacularea în gură
- O bună igienă bucală
- Încărcătura virală mică

02 OBSERVAȚII

- Sexul oral, în general, prezintă un risc scăzut de infecție, deși există și alți factori care influențează.
- În cazul în care persoana cu HIV are încărcătura virală mare sau ejacularea în gură, crește riscul. Același lucru se aplică în cazul în care o persoană fără HIV, are răni, tăieturi sau îi sângerează gingiile.
- Având o încărcătură virală nedetectabilă reduce semnificativ riscul de transmitere a virusului HIV prin oricare practică sexuală.
- Dacă există riscul nu neapărat înseamnă că v-ați infectat. Dacă aveți dubii, cel mai bine ar fi realizarea unui test pentru HIV.



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org