


## ОРАЛЬНЫЙ СЕКС И ВИЧ



Оральный секс - это практика, которая, в целом, несет малый риск передачи ВИЧ. Однако существуют разные факторы, которые могут сделать риск большим или меньшим.

### 01 ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ НА РИСК ПЕРЕДАЧИ

- Независимо от других факторов, когда человек с ВИЧ принимает антиретровиальное лечение, это уменьшает вирусное присутствие, и риск передачи вируса может уменьшиться существенно.
- Несмотря на то что наши отношения которые приносят малый риск, это может уменьшить еще больше если вы используете презерватив
- Если человек с ВИЧ практикует оральный секс, риск передачи вируса своему партнеру очень маленький, так как вирус не передается через слюну.
- Если женщина с ВИЧ получает оральный секс, риск передачи также очень маленький. Однако, этот риск может увеличиться во время менструации, так как может присутствовать кровь с вирусом.
- Если человек с ВИЧ эякулирует в рот своего партнера, то этот риск больше, так как в сперме есть большое количество вируса, особенно если лечение не принимается.
- Если человек с ВИЧ, который практикует оральный секс, имеет порезы или язвы во рту и кровоточащие десны, то он имеет больший риск приобретения вируса, чем тот, у кого хорошее здоровье рта.

Не существует однозначного мнения о том, способна ли жидкость, выделяющаяся до эякуляции, передавать ВИЧ. В целом, риск очень маленький, так как ее объем небольшой, но он связан также с другими факторами, такими как вирусное присутствие.


#### БОЛЬШОЙ РИСК

- Практиковать оральный секс с человеком с ВИЧ.
- Получать эякуляцию в рот.
- Раны или язвы во рту или кровоточащие десны.
- Высокое вирусное присутствие.



#### МЕНЬШИЙ РИСК

- Получать оральный секс от человека с ВИЧ.
- Не получать эякуляцию в рот.
- Хорошая гигиена рта.
- Маленькое вирусное присутствие.



### 02 ВАЖНО

- В целом, оральный секс несет небольшой риск от инфекции, хотя существуют и другие факторы, которые влияют на это.
- Если человек с ВИЧ имеет высокое вирусное присутствие или эякулирует в рот, это увеличивают риск. То же самое происходит, если человек без ВИЧ имеет раны и язвы во рту и кровоточащие десны.
- Факт неопределяемого вирусного присутствия уменьшает риск передачи ВИЧ через любую сексуальную практику.
- Наличие риска не значит, что вы заразились. Если у вас есть сомнения, то лучше осуществить анализы на определение ВИЧ.



**GTT-VIH**  
GRUPO DE TRABAJO SOBRE  
TRATAMIENTOS DEL VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Salut**  
PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA  
DE LA SIDA



FOR SOLIDARIDAD  
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,  
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació  
Barcelona  
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



ETIS  
SIEMPRE FRENTE AL  
INMIGRACIÓ I SALUT



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org