

هناك أقل خطر
لانتقال VIH إذا كانت
حمولتك الفيروسية
غير قابلة للكشف
بفضل العلاج بمضاد
الفيروس.

هناك احتمالات أقل لكي تنقل VIH إذا ما:

9 لا أنت ولا شريكك لديكما عدوى
تنتقل جنسيا.




من المهم القيام بفحوصات حول
الصحة الجنسية بشكل دوري.

9 تناول كل جرعات العلاج المضاد
للفيروس في الوقت المناسب
و بكميات مناسبة.



إذا لم تقم بهذا، قد تزيد حمولتك
الفيروسية.

9 ظلت حمولتك الفيروسية "غير
قابلة للكشف" لعدة أشهر. و هذا
يعني أنه لا يوجد سوى كمية صغيرة
من VIH في الدم.



فمن المهم التحقق من حمولتك
الفيروسية بشكل دوري.

من الجدير بالذكر

- الإستهلال الصحيح للغشاء
الواقى هو السبيل الأكثر وقاية
من انتقال VIH.
- العلاج الفعال ل VIH يقلل أيضا
من خطر انتقال VIH.
- ينبغي على العاملين في
المجال الطبي أن يقدموا لك
ولشريكك نصائح حول كيفية
الوقاية من انتقال العدوى، مع
أخذ الإعتبار الظروف الشخصية
الخاصة بكما.

إذا كان هناك مثل هذه الظروف، هل من الممكن أن ينتقل VIH؟
نعم، انتقال VIH يمكن أن يحدث.



على الرغم من أن هناك أدلة علمية
على أن العلاج يقلل من خطر انتقال
VIH، البحث في هذه القضية لا يزال
مفتوحا.



من الممكن ان يحدث أثناء ممارسة
الجنس عن طريق الشرج بدون وقاية
على غرار أنواع أخرى من العلاقات
الجنسية.