


Existen argumentos a favor y en contra de iniciar ya el tratamiento contra la hepatitis C o dejarlo para más tarde.

### Motivos para retrasar el tratamiento:

El tratamiento contra la hepatitis C **no siempre funciona**.



En los próximos años se dispondrá de **nuevos y mejores fármacos**.



Los **efectos secundarios**, como la sensación de cansancio, malestar o cambios de humor, pueden ser graves, aunque varían de una persona a otra.




### Es posible que desees retrasar el tratamiento:

Si tienes **otras prioridades** en el momento, como el trabajo o las relaciones personales.



Si te resultara difícil tomar **todas las dosis** de fármacos tal y como deben tomarse.



Si tú o tu pareja **esperáis un hijo o el embarazo se puede producir** durante el tratamiento.



Si tienes una **cepa** del virus de la hepatitis C (genotipos 1 o 4) que resulta más difícil de tratar con los fármacos actuales.




### Motivos para tomar ya el tratamiento:

El tratamiento puede **mejorar tu salud y evitar que se produzcan daños** en el hígado.



Si el tratamiento tiene éxito te **curará la hepatitis C**.



Tras un tratamiento exitoso, **dejará de existir riesgo de transmitir** la hepatitis C a otra persona.



El tratamiento no es para siempre. Por lo general, dura **6, 12 o 18 meses**.



### Es posible que sea buena idea empezar ya el tratamiento:

Si te infectaste hace **menos de seis meses**, dado que en este caso el tratamiento tiene más posibilidades de tener éxito.



Si tienes una **cepa** del virus de la hepatitis C (genotipos 2 o 3) que es más fácil de curar.



Si tu hígado ya está **muy dañado** (se necesita el tratamiento con urgencia).



### Notas:

Puedes tomar fármacos contra la hepatitis C y el VIH al mismo tiempo, pero es recomendable **no iniciar** los dos tratamientos a la vez.

**Si tu hígado está más débil que tu sistema inmunitario**, es mejor empezar antes el tratamiento contra la hepatitis C y tomar la terapia contra el VIH después.

**Si tu sistema inmunitario está más débil que tu hígado**, es mejor iniciar antes la terapia contra el VIH y añadir el tratamiento contra la hepatitis C más adelante.

**Si ya estás estable con un tratamiento contra el VIH**, es mejor que continúes con él y que pieces el tratamiento contra la hepatitis C cuando sea necesario.

Algunos fármacos contra el VIH no son adecuados para las personas que toman medicamentos contra la hepatitis C, pero existen alternativas disponibles.

**Embarazo:** El fármaco ribavirina puede dañar al feto. Si tú o tu pareja habéis tomado ribavirina en los últimos seis meses, debéis utilizar anticonceptivos para evitar embarazos.

### A destacar:

- Decidir cuál es el mejor momento para iniciar el tratamiento contra la hepatitis C no resulta sencillo.
- Es importante recibir apoyo y asesoramiento para ayudarte a tomar esta decisión.