


Există argumente pro și contra pentru începerea unui tratament contra hepatitei C sau să fie lăsat pentru mai târziu.

Motive pentru amânarea tratamentului:

Tratamentul contra hepatitei C **nu funcționează întotdeauna.**



În următorii ani vor exista **medicamente noi și mai bune.**



Efectele secundare, cum ar fi senzație de oboseală, supărarea sau schimbări în starea de umor, pot fi grave, deși acestea variază de la o persoană la alta.




Poate doriți amânarea tratamentului:

Dacă aveți **alte priorități** în același timp, cum ar fi munca sau relațiile personale.



Dacă vi se pare dificil să luați medicamentele precum **sunt prescrise.**



Dacă dvs. sau partenera/ul dvs. **așteaptă un copil sau apare o sarcină în timpul tratamentului.**




Dacă aveți o hepatita C (genotipul 1 sau 4), este mult mai dificil de tratat cu medicamentele actuale.




Motive pentru a lua tratamentul:

Tratamentul poate **îmbunătăți sănătatea dumneavoastră și evita deteriorarea ficatului.**



Dacă tratamentul are efect pozitiv, **va vindeca hepatita C.**



După un tratament de succes, va înceta să mai existe riscul de **transmitere a hepatitei C** altora.



Tratamentul nu este pentru totdeauna. În mod general are o durată de **6, 12 sau 18 luni.**



Este o idee bună începerea tratamentului cât mai curând:


Dacă **ați fost infectat în ultimele șase luni**, în acest caz, este mult mai probabil ca tratamentul să fie de succes.



Dacă aveți o tulpină a virusului hepatitei C (genotip 2 sau 3) este mai ușor de a o vindeca.



Dacă deja ficatul este **grav afectat** (necesită tratament de urgență).



Notițe:

Puteți lua medicamente împotriva hepatitei C și HIV, în același timp, dar **nu este recomandată începerea** celor două tratamente deodată.

Dacă ficatul dumneavoastră este mai debilitat decât sistemul imunitar, e mai bine începerea tratamentului de hepatita C înainte și după aceea terapia HIV.

În cazul în care sistemul imunitar este mai debilitat decât ficatul, cel mai bine este să începe-ți mai întâi tratamentul HIV și adăugați tratamentul hepatitei C mai târziu.

Dacă sunteți deja stabil cu tratamentul HIV, cel mai bine e să continuați cu el și să începeți tratarea hepatitei C, atunci când este necesar.

Unele medicamente anti-HIV nu sunt potrivite pentru persoanele care iau medicamente pentru hepatita C, dar există alte alternative.

Sarcina: Medicamentul ribavirina poate dăuna fătului. Dacă dvs. sau partenerul dvs. ați luat ribavirina în ultimele șase luni, trebuie să utilizați metode contraceptive pentru a preveni sarcina.

Observații:

- A decide care este cel mai bun moment pentru a începe un tratament de hepatita C nu este simplu.
- Este important obținerea de sprijin și consiliere pentru a vă ajuta să luați această decizie.