


Существуют аргументы за и против начала лечения гепатита С сразу или начать лечение позже.

Мотивы задержаться с лечением:

Лечение против гепатита С **не всегда успешно.**



В последующие годы появятся **новые и лучшие препараты.**



Побочные эффекты, такие как чувство усталости, недомогание или перемены настроения, могут быть в тяжелой форме, хотя различны для каждого человека.




Возможно, вы желаете задержаться с лечением:

Если у вас **другие приоритеты** в тот момент, такие как работа или личные отношения.



Если вам сложно принимать **препараты в той дозе**, которая вам предписана.



Если вы или ваш партнер **ждете ребенка, или беременность возникла** в ходе лечения.




Если у вас **штамм** вируса гепатита С (генотипы 1 или 4), который труднее лечить с теми препаратами, которые уже существуют.




Мотивы сразу начать лечение:

Лечение может **улучшить ваше здоровье и избежать последующих повреждений** печени.



Если лечение успешно, то **гепатит С вылечится**.



После успешного лечения, не будет риска **передачи гепатита С** другому человеку.



Лечение имеет ограниченный срок. В общем, оно длится **6, 12 или 18 месяцев**.



Возможно, лечение лучше начать сразу:

Если вы заразились **менее 6 месяцев** назад, в этом случае больше возможностей иметь успех в лечении.



Если у вас **штамм** вируса гепатита С (генотипы 2 или 3), его легче вылечить.



Если ваша печень уже **очень повреждена** (нуждается в срочном лечении).



Заметки:

Можете принимать препараты против гепатита С или ВИЧ в то же самое время, но рекомендуется не начинать два лечения в одно и то же время.

Если ваша печень более слабая, чем ваша иммунная система, лучше начать с лечения гепатита С и лечение ВИЧ отложить на потом.

Если ваша иммунная система более слабая, чем ваша печень, лучше начать с лечения ВИЧ и добавить лечение гепатита С после.

Если вы уже стабильны с лечением ВИЧ, то желательно следовать ему и начать лечение гепатита С, когда это будет вам необходимо.

Некоторые препараты против ВИЧ не адекватны для людей, которые принимают препараты против гепатита С. Однако, существуют другие доступные препараты.

Беременность: Препарат рибавирин (ribavirina) может повредить фетус. Если вы или ваш партнер принимали рибавирин (ribavirina) в последние шесть месяцев, вам нужно использовать контрацептивы для избегания беременности.

Важно:

- Выбрать лучший момент начать лечение гепатита С - не всегда просто.
- Важно получать поддержку и совет для принятия решения.