

الجنس بدون وقاية

يعرف الجنس بدون وقاية بالاتصال الجنسي بدون استعمال الفشاء الواقي او احد الحواجز الوقائية المشابهة . الكثير من الامراض المنتقلة جنسيا يمكن ان تنتقل عبر علاقه جنسية بدون وقاية وهذه هي بالنسبة للجميع ،الطريقة العامة لتنقل فيروس السيدا. العلاقات الجنسية الشرجية او المهبلية بدون وقاية تسبب خطر كبير ولو ان العديد من انواع العدوى ايضا يمكن ان تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية عبر الفم او الشرج بدون وقاية.

الجنس مع اشخاص حاملين للفيروس

ادا ما كنت حامل لفيروس السيدا وتعارض الجنس مع اشخاص غير حاملين للفيروس او في حالة غير معروفة ، احسن طريقة للوقاية من الفيروس او لوقاية نفسك من امراض جنسية محتملة هي استعمال الفشاء الواقي. ولو ان الدويبة ضد الفيروس قضت على الشحنة الفيروسية واصبحت غير مكتشفة يمكنك ان تنتقل الفيروس لشخص اخر .

الجنس مع اشخاص حاملين لفيروس السيدا

ادا ما كنت حامل لفيروس السيدا وتعارض الجنس مع اشخاص اخرى حاملة لفيروس السيدا، ينصح باستعمال الفشاء الواقي خلال هذه العلاقات الجنسية لان:

ـ بهذه الطريقة يمكنك تفادي العدوى مرة اخرى بفترات VIII جديدة التي يمكن ان تكون مقاومة للدويبة ضد الفيروس او يمكن ان تكون جد اعتدانية للجسم.
ـ ايضا يتم تفادي خطر الاصابة وتنتقل الامراض المنتقلة جنسيا.

دراسات حديثة بينت بأنه توجد خلايا مصابة بامكانها التسبب في العدوى بالفيروس VIH في المخاط الشرجي للرجال والنساء، ولو كان الفيروس مكتشف في الدم.
يتوقع بان الاشخاص الحاملين والغير حاملين للفيروس VIH يمكن ان يصابوا بعدوى فترات مقاومة للادوية المضادة للفيروس.

الامراض المنتقلة جنسيا

أغلب هذه الامراض يمكن ان تعالج . هكذا فان داء السيلان او الكلاميبيا يمكن معا لجتها بطريقة ناجحة في الاشخاص الحاملين للفيروس مع ذلك، فان مرض الزهرى يمكن ان يكون اكثر اعتداء واكثر صعوبة لتشخيصه وعلاجه في الاشخاص الحاملين للفيروس.



الامراض المتنقلة جنسيا من نوع فيروسي مثلا لعقيولة التناسلية او التالل ليس لها علاج حتى بالنسبة للأشخاص الغير الحاملين للفيروس.

هذه الامراض يمكن مراقبتها بالدواء لكن يمكن ان تتكسر اعراضها في المستقبل.

زيادة على هذا، في حالة الاشخاص الحاملين للفيروس يمكن ان تكون اكثر صعوبة لمعا لجتها.

بعض الامراض الانتهارية التي يتاثر بها الاشخاص الحاملين للفيروس يمكن ان تنتقل عن طريق الجنس.

مثلا حاليا يعتقد ان فيروس الورم اللحمي Kaposi يمكن ان ينتقل عن طريق الجنس. الاشخاص الحاملين او الغير الحاملين للسيدا يمكن ان يصابوا ببعض الاصحاء مثل الجيربيا و امنيلا Criptosporidium, Microsporidium التي يدورها يمكن ان تنتقل عن طريق اتصال شرجي بدون وقاية. هذه يمكن ان تسبب اسهال خطير وصعب جدا علاجه في الاشخاص الحاملين للفيروس.

Citomegalovirus (CMV) يمكن ان يسبب سلسلة من الامراض في الاشخاص ذو معدل منخفض من خلايا CD4 و ايضا يتنتقل عن طريق العلاقات الجنسية بدون وقاية. الطريقة الوحيدة لمعرفة الاصابة ب CMV هي عن طريق تحاليل الدم. اذا لم تصب بعد بهذا الفيروس، من المستحسن ان تقوم بجميع الاحتياطات لتجنب التعرض اليه.

مرض التهاب الكبد A ب ومن المحتمل س ايضا يمكن ان ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية بدون وقاية.

بالنسبة للأشخاص الحاملين لفيروس السيدا، حسب حالة جهاز مناعتهم، العدوى بالتهاب الكبد يمكن ان تزيد من خطورة الحالة الصحية.

بالنسبة لغالب الناس العدوى عن طريق الغير، يمكن ان تسبب اضرار في الكبد التي يدورها يمكن ان تجعل تقبل الادوية المضادة للفيروس جد صعبة.

من الحظر ان هناك حقن تحمي من التهاب الكبد A ب رغم ان هذه الحقن اقل فعالية في الاشخاص الحاملين للسيدا (خاصة الذين لديهم معدل خلايا CD4 منخفض)

الأشخاص الحاملة لفيروس السيدا ولاحد الامراض المتنقلة جنسيا، لديهم مستويات عالية من الغيروس في السوائل التناسلية مما يسبب تنقل الفيروس بشكل متيسر خلال العلاقات الجنسية بدون وقاية.

ادا ما عولجت الامراض المتنقلة جنسيا ETS بطريقة صحيحة تنقص كمية الفيروس في السوائل التناسلية.

قرار شخصي

ادا كانت لديك علاقات مع اشخاص غير حاملين للسيدا او ان حالتهم غير معروفة، من المستحسن ان تستعمل الغشاء الواقي خلال العلاقات الجنسية.

بعض الاشخاص الحاملة للفيروس يقررون عدم استعمال اي وقاية خلال العلاقات الجنسية مع الاشخاص الحاملين ايضا للفيروس، رغم انهم يعرفون الخطير الذي يمكن ان يؤدي اليه هذا القرار.

هذا قرار شخصي لكن يجب اخذ بعين الاعتبار اخطاره، وبعد ذلك يمكن تقرير اذا ما كانت متعة العلاقات الجنسية بدون وقاية تعيش عن الاخطار الممكنة.

ادا كنت قررت من قبل ممارسة الجنس بدون وقاية مع اشخاص حاملين لفيروس السيدا، يمكنك الان ان تغير رأيك و خاصة اذا اخذت بعين الاعتبار ان تنقل المطربيات المقاومة للادوية ترداد، مما ينقص من احتمالات العلاج في الكثير من الحالات.