



من الممكن أن لا تحتاج تناول الأدوية المضادة لـ VIH على الفور. يتعلق ذلك بمدى تأثير الفيروس على جهاز المناعة.


3 إذا كان عدد CD4 منخفضاً ، هذا يعني أن VIH أضعف جهاز المناعة.




2 إحصاء CD4 هو تحليل للدم يوفر معلومات حول جهاز المناعة. وجود مستوى عالٍ من CD4 يعني أن جهاز المناعة قويا.




1 جهاز المناعة هو آلية دفاعية طبيعية للجسم. عندما يكون قويا، يمكنه رفض العدوى والمرض في حد ذاته.



6 إن التداوي بمضادات VIH يقوي جهاز مناعتك ، ويكون قادرا من جديد على مواجهة العدوى والأمراض.



5 اتباع التداوي بمضادات الفيروس يتطلب اتخاذ كل الأقراس في نفس الوقت و كل يوم. ينبغي أن تكون على استعداد لتلبية هذا الالتزام.



4 إذا كان عدد CD4 أقل من 350 خلية/ملم مكعب ، ينصح ببداية العلاج.



nam

Este material se basa en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino Unido. La publicación original está disponible en www.aidsmap.com La traducción de este material se ha realizado con autorización de NAM.



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencionado por:



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Programa de Prevenció i Assistència de la Sida

Ajuntament de Barcelona
Àrea d'Acció Social y Ciutadania

Diputació de Barcelona
Àrea de Benestar Social

Colaboran:



إشارات

من المستحسن أن جميع المرضى ذوي عدد CD4 أقل من 350 خلية/ملم مكعب ويشعرون بأنهم مستعدون، بداية التدوي بمضادات الفيروس. ويوصى بصفة خاصة وإذا كان عدد CD4 أقل من 200 خلية/ملم مكعب..

الطبيب أو العاملين في المجال الطبي يمكنهم الرد على أي سؤال قد يكون لديك بشأن التدوي ضد VIH ويساعدونك على أن تقرر ما إذا كنت على استعداد لبداية العلاج.

أحيانا، المرضى يقومون ببداية التدوي عندما يكون عدد CD4 أكثر من 350 خلية/ملم مكعب . من الممكن أن طبيبك ينصحك به في الحالات التالية :

- VIH يجعل منك مريضا.
- لديك مشاكل صحية أخرى ، مثل التهاب الكبد أو مرض السكري
- لديك زيادة خطر أمراض القلب
- لديك أكثر من 50 عاما ، أو
- لديك علاقة مع شخص غير مصاب ب VIH (التدوي يقلل من خطر انتقال الفيروس)

نقاط مهمة

- توصيات الأطباء الإسبان تنصح ببداية التدوي عندما يكون عدد CD4 أقل من 350 خلية/ملم مكعب.
- تناول الأدوية يمنع من استمرار الأضرار التي تلحق بجهاز المناعة ، مما يعني سيكون لديك أقل خطر للمرض في المستقبل.

nam

Este material se basa en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino Unido. La publicación original está disponible en www.aidsmap.com La traducción de este material se ha realizado con autorización de NAM.



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH

contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencionado por:



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Programa de Prevenció i
Assistència de la Sida

Ajuntament de Barcelona

Àrea d'Acció Social y Ciutadania

Diputació de Barcelona

Àrea de Benestar Social



Colaboran:

