

InfoVIHtal #34

对携带VIH病毒的人接种疫苗的忠告

对携带VIH病毒的人接种疫苗的忠告

了解到并不是所有的疫苗都被认为是合适的这一点可能是有用处的, 这样以来, 接受某些疫苗的接种会产生某些矛盾并且对携带VIH病毒的人接种疫苗更需要有某些特殊的重视.

当你在关于是否接种疫苗的问题上拥有疑问时, 该文件仅在你能够同你的VIH病毒的医生一起来评论时设法给你提供某些指导.

疫苗是哪些?

疫苗是用来加强并增加身体的抵抗力来对付某些传染或疾病的药物治疗. 例如, 每年秋季许多人接种疫苗来抵御流行性感冒. 在接种疫苗后, 免疫系统能够拖至两个星期后才作出反应. 大多数疫苗的使用是用来预防传染, 这些疫苗被以'预防性疫苗'而认识, 同时也存在着其他的疫苗, 它们帮助打击已存在的感染, 这些疫苗被以'治疗性疫苗'而认识.

对所有携带VIH病毒的成年人所推荐的疫苗

疫苗	剂量	注释及忠告
乙肝病毒疫苗 (VHB)	在六个月期间注射三次注射液疫苗.	建议至少要拥有免疫力的显示或活跃性肝炎的显示, 当一系列的疫苗都注射完后, 应进行一次血液化验来核实一下VHB抗体的水平, 并且若是抗体不够时应给予新的剂量.
流行性感冒	一次注射液疫苗	建议每年都给注射一次, 不可使用鼻腔喷雾剂式的疫苗 (FluMist).
麻疹, 甲状腺肿及风疹	一次或两次注射液疫苗	是仅有的对患VIH病毒性疾病的人所推荐的活病毒性疫苗, 对那些CD4重读数即CD4 < 200 细胞/mm ³ 的人以及一个取决于艾滋病病史的人以及患有VIH病毒性疾病临床症状的人是阻止使用的. 那些在1957年之前出生的人不需要接受这种疫苗. 如果比须要达到适当的抗体水平, 那么每种疫苗的组成部分都是可以分开给予接种的.
针对肺炎的抗肺炎双球菌	一次或两次注射液疫苗	除非那些在五年前的期间中就已经开始患此病的人, 应该在得到患VIH病毒性疾病的诊断结论后就马上给予接种此疫苗. 如果在打此疫苗时, CD4重读数即CD4 < 200 细胞/mm ³ , 那么疫苗的接种应该在CD4重读数即CD4 ≥ 200 细胞/mm ³ 时再重新进行一次, 此种疫苗在每五年重新接种一次.
破伤风疫苗及白喉	一次注射液疫苗	每十年重新接种一次.

对某些患有VIH病毒性疾病的成年人所推荐的疫苗

疫苗	剂量	注释及忠告
甲肝病毒疫苗 (VHA)	在一年或一年半期间两次注射液疫苗	推荐给那些男性同男性进行性交的人, 静脉注射毒品的使用者, 那些患慢性肝部疾病的人, 患血友病的人或那些到世界某些地区旅游的人.
甲肝病毒及乙肝病毒相配合的疫苗	在一年期间三次注射液疫苗	给予那些面临这两种肝病(即甲乙型肝炎)具有免疫力的人所接种的疫苗.
对细菌性脑膜炎而使用的B类的流感嗜血杆菌	一次注射液疫苗	关于这种疫苗的需求, 要据具体的情况同专业医生进行讨论.
对细菌性脑膜炎而使用的脑膜炎双球	一次注射液疫苗	

菌		
---	--	--

对患有VIH病毒性疾病的人不推荐的疫苗

疫苗	与此有关的疾病	注释及忠告
水痘	水痘	目前，水痘疫苗是一种活病毒性疫苗，除三种病毒疫苗以外，活病毒性疫苗对患有VIH病毒性疾病的人是不建议使用的。
带状疱疹	疱疹	
炭疽	炭疽	炭疽疫苗在西班牙没有上市，尽管炭疽疫苗日前在某些国家已商业化并且不是一种活病毒性疫苗，但对常规的疫苗接种是不建议用此的。