



Muchas personas con VIH han tenido hijos sin transmitirles el virus. Para conseguirlo, necesitas un poco de ayuda de tu médico.

Si eres una mujer con VIH


- Tomar fármacos antirretrovirales durante el embarazo protegerá al bebé del VIH.



- **Un parto por cesárea es lo más seguro.** Aunque también es posible tener un parto vaginal.



- No deberías **amamantar** a tu bebé.



- En las semanas siguientes el parto, será necesario que el bebé tome medicamentos para el VIH.



- Cuando se siguen estos consejos, menos de un bebé de cada 100 se infecta por el VIH.





Si eres un hombre con VIH

- Mantener relaciones sexuales no protegidas con una mujer sin VIH podría suponer la transmisión del virus a la mujer y, a su vez, al bebé.

- Si la futura madre no tiene el VIH, el bebé no se infectará, ya que el virus no puede transmitirse directamente del padre al hijo.

- Puedes consultar con tu médico qué riesgo tendría para ti el mantener relaciones sexuales sin protección en este momento, ya que es diferente para cada persona.

- El **'lavado de esperma'** es un proceso que elimina el VIH del esperma. Permitirá que tu pareja quede embarazada sin riesgo alguno.



A destacar

- En España, los médicos de VIH están preparados para atender a las mujeres con VIH que quieren ser madres.

- La atención médica para padres con VIH no es tan común, pero existe.

- Si estás pensando en tener un hijo, sería conveniente que lo consultaras con tu médico lo antes posible.



Este material se basa en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino Unido. La publicación original está disponible en www.aidsmap.com. La traducción de este material se ha realizado con la autorización de NAM.



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencionado por:



Colaboran:

