



Existe un menor riesgo de transmitir el VIH si tu carga viral es indetectable gracias al tratamiento antirretroviral.



Hay menos probabilidades de que transmitas el VIH si:


Tu carga viral ha permanecido 'indetectable' durante varios meses. Esto significa que sólo existe una pequeña cantidad de VIH en sangre.



Es importante que compruebes tu carga viral de forma periódica.

y

Tomas todas las dosis de tu tratamiento antirretroviral en el momento preciso y en las cantidades adecuadas.



Si no lo haces así, tu carga viral podría aumentar.

y


Ni tú ni tu pareja tenéis una infección de transmisión sexual.



Es importante realizar exámenes de salud sexual de forma periódica.

Si se dan dichas circunstancias, ¿es posible que el VIH se transmita?

Sí, la transmisión del VIH aún se puede producir.



Es más probable que se produzca durante el sexo anal sin protección que durante otros tipos de relaciones sexuales.



Aunque cada vez hay más indicios científicos de que el tratamiento reduce el riesgo de transmisión del VIH, la investigación sobre este tema continúa abierta.

A destacar

- El uso adecuado de los preservativos es el modo más fiable de prevenir la transmisión del VIH.
- Un tratamiento eficaz del VIH también reduce el riesgo de transmisión del virus.
- El personal médico debería asesoraros tanto a ti como a tu pareja sobre cómo evitar la transmisión, a partir de vuestras propias circunstancias personales.