


Si la tuberculosis te está haciendo enfermar y, además, tienes el VIH, por lo general tendrás que tomar tratamiento contra las dos infecciones.


1 Con el tratamiento antituberculoso, puedes librarte de la bacteria que provoca la tuberculosis (TB).

Anti-TB

- En otras palabras, puedes curarte de la tuberculosis.
- Por lo general es necesario unos seis meses, pero puede prolongarse más tiempo.




3 Algunas personas inician primero el tratamiento antituberculoso y luego empiezan el tratamiento contra el VIH unas pocas semanas o meses más tarde.



2 Con el tratamiento anti-VIH, reduces la posibilidad de volver a infectarte por tuberculosis de nuevo en el futuro.


Anti-VIH

- El tratamiento antirretroviral ayuda a evitar que el VIH dañe el sistema inmunitario.
- Un sistema inmunitario fuerte protege al organismo frente a las infecciones, incluida la tuberculosis.



4 Sin embargo, otras personas tienen que iniciar ambos tratamientos a la vez.

- Esto dependerá de la urgencia con la que precises el tratamiento anti-VIH.



A destacar

- Los fármacos antituberculosos pueden acabar con la bacteria que produce la tuberculosis.
- Los fármacos antirretrovirales pueden hacer más fuerte tu sistema inmunitario. Esto te ayudará a evitar que te infectes de nuevo por tuberculosis en el futuro.

Nota

Tanto en el caso del tratamiento antituberculoso como del antirretroviral, **es muy importante tomar todas las dosis tal y como se prescribieron**. Tras varias semanas de terapia, es posible que te sientas mejor, pero la tuberculosis y el VIH seguirán presente en tu organismo. Si dejas de tomar el tratamiento, puedes enfermar de nuevo. Sin embargo, además de prevenir enfermedades, estos fármacos también pueden **provocar efectos secundarios**, especialmente cuando se toman juntos.



Esta ficha se basa en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino Unido. La publicación original está disponible en www.aidsmap.com. La traducción de este material se ha realizado con la autorización de NAM.



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencionado por:



Colaboran:

