

Gonorrhée

La gonorrhée est une infection sexuellement transmissible (IST), que l'on considérait en extinction en Espagne jusqu'à l'an 2000. Les autorités sanitaires espagnoles et les ONG sont cependant préoccupées par l'augmentation des cas de gonorrhée, en particulier chez les hommes ayant des pratiques sexuelles avec d'autres hommes et chez les jeunes hétérosexuels des deux sexes. La population immigrante elle-même n'est pas exempte de ce risque.

Transmission

La gonorrhée peut se contracter lors des relations sexuelles orales, anales, vaginales et de typo oral-anal non protégées (sans préservatif). Ainsi, cette infection peut affecter l'anus, la verge, le col de l'utérus et la gorge. Une gonorrhée non traitée peut renforcer la transmission du VIH, car elle augmente le nombre de cellules infectées par VIH au niveau de la zone génitale et des membranes muqueuses de la bouche et de la gorge. De la même façon, chez les personnes non atteintes du VIH, l'infection par gonorrhée facilite la possibilité de contracter le VIH si elles s'exposent au virus.

La gonorrhée peut aussi se transmettre de mère à enfant (TME) lors de l'accouchement, pouvant causer une infection au niveau des yeux du bébé et évoluer vers une cécité si elle est non traitée. (voir *InfoVIHtal #42 Transmission de mère à enfant*).

Prévention

L'utilisation du préservatif lors des pratiques sexuelles orales, anales ou vaginales est une manière efficace d'éviter l'infection par la gonorrhée ou de contaminer d'autres personnes. On recommande aux personnes sexuellement actives de se soumettre régulièrement à des bilans de santé au cours desquels ils réaliseront des tests de gonorrhée et d'autres IST (voir *InfoVIHtal #25 Bilans de santé sexuelle*).

Symptômes

Les symptômes de la gonorrhée apparaissent normalement entre deux et 10 jours après l'infection. Cependant certaines personnes qui en sont atteintes l'ignorent car les symptômes ne se manifestent pas toujours ou bien peuvent être de faible intensité. Chez les hommes les symptômes sont généralement la sécrétion d'un liquide de couleur verdâtre ou jaunâtre à travers la verge et des brûlures au moment d'uriner. Les testicules peuvent être douloureux ou bien enflés.

Chez les femmes les symptômes peuvent être des brûlures au moment d'uriner et la sécrétion d'un fluide transparent ou sanguinolent à travers le vagin. Si l'infection est

rectale, cela peut impliquer aussi bien chez les femmes que chez les hommes une sécrétion anale d'un fluide d'aspect muqueux ou sanguinolent, et une douleur anale pouvant apparaître aussi lors des pratiques sexuelles anales. La gonorrhée peut causer des irritations au niveau de la gorge.

Si elle n'est pas traitée, la gonorrhée peut causer des problèmes de santé plus graves: infections pelviennes douloureuses, infertilité et grossesse ectopique (chez les femmes) ainsi que des problèmes testiculaires chez les hommes.

La gonorrhée peut s'étendre au torrent sanguin provoquant de la fièvre et peut causer une douleur arthritique ainsi qu'un gonflement des articulations.

Diagnostic

Un bilan général de santé sexuelle comporte un test de gonorrhée. Les bilans de santé sexuelle sont gratuits et confidentiels. Vous pouvez vous rendre auprès des centres publics spécialisés en IST ou bien dans les Centres de Première Assistance (CAP) afin que votre médecin traitant vous dirige vers ces centres. D'autre part, dans les unités de maladies infectieuses de certains hôpitaux, il est possible aussi que l'on vous propose des analyses de santé sexuelle.

Au moment du test, on prélève un échantillon à l'extrémité de la verge ou du col de l'utérus au moyen d'un bâtonnet. Si vous avez fait part à votre médecin de la réalisation de pratiques sexuelles orales ou anales, on prélèvera aussi des échantillons au niveau de la gorge et de l'anus. L'utilisation de bâtonnets peut être un peu gênante. Aussi, dans certains cas on prélève un échantillon d'urine pour détecter la présence de gonorrhée. Il est normalement possible de connaître le résultat de forme immédiate dans l'examen par bâtonnet en ce qui concerne la verge, ou dans la plupart des cas pour le col de l'utérus ; mais au niveau de la gorge la gonorrhée peut seulement être diagnostiquée postérieurement. Cependant, quel que soit le lieu de l'infection, l'obtention de résultats concluants peut prendre trois jours. Il est important par conséquent de contacter votre médecin pour connaître le résultat et de commencer le traitement si la bactérie a été détectée.

Traitement

La gonorrhée se traite avec des antibiotiques. La pénicilline ou le ciprofloxacine sont en général les antibiotiques de premier choix pour son traitement. Cependant environ 10% des cas de gonorrhée sont résistants au ciprofloxacine, un pourcentage supérieur est même résistant à la pénicilline. C'est pour cette raison que les médecins utilisent à l'heure actuelle la ceftriaxone ou la spectinomycine comme médicament de premier choix pour le traitement de la gonorrhée. Les deux médicaments doivent être administrés par injection.

Après un diagnostic de gonorrhée, certains centres offrent la possibilité de consulter un conseiller ou une conseillère santé. Ces conseillers ou conseillères peuvent vous offrir des informations sur le sexe sans risque et sur la santé sexuelle, vous aidant à vous protéger vous-même ainsi que votre ou vos partenaires sexuels stables ou occasionnels.

On vous demandera aussi de retourner sept jours plus tard pour réaliser des tests visant à éliminer la présence d'une infection dans votre organisme. D'autre part, il est fortement recommandé d'éviter d'avoir des relations sexuelles anales, orales ou vaginales (même avec préservatif) pendant la période de traitement afin de prévenir une réinfection.



grupo de trabajo
sobre tratamientos del VIH
e-mail: contact@gtt-vih.org
website: www.gtt-vih.org

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

 Generalitat
de Catalunya
Departament
de Salut



FUNDACIÓN
ERENTA

Subvencionado por:



Secretaría del Plan
Nacional sobre el Sida