



**Vous n'aurez peut-être pas besoin de prendre le traitement de suite.
Cela dépend des effets du VIH sur votre système immunitaire.**


- 1** Le système immunitaire est le système naturel de défense de l'organisme. Lorsqu'il est costaud, il peut combattre les infections et les maladies de lui-même




- 2** Le taux de CD4 est un examen sanguin qui vous donne des informations sur votre système immunitaire. Un taux de CD4 élevé signifie que votre système immunitaire est fort.




- 3** Si votre taux de CD4 est bas, le VIH a affaibli votre système immunitaire.




- 4** Si votre taux de CD4 descend en dessous de 350, on recommande de commencer le traitement.



- 5** Le traitement anti-VIH nécessite la prise de pilules tous les jours à la même heure. Vous devez vous sentir prêt(e) à cet engagement.



- 6** Le traitement anti-VIH renforcera votre système immunitaire. Il pourra de nouveau combattre les infections et les maladies.



nam

Ce matériel se base sur une publication soumise au copyright original de NAM, organisation sans but lucratif du VIH, qui a son siège au Royaume Uni. La publication originale est disponible sur www.aidsmap.com. La traduction de ce matériel a été réalisée avec l'autorisation de NAM.



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

Subvencio-

nado por:



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Programa de Prevenció i
Assistència de la Sida



Àrea d'Acció Social y Ciutadania



Àrea de Benestar Social

Colaboran:



POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Les points essentiels

● Les directives médicales européennes recommandent de commencer le traitement lorsque le taux de cellules CD4 descend en dessous de 350.

● La prise du traitement évitera des dommages supplémentaires à votre système immunitaire et réduira ainsi les risques de maladies à l'avenir.

Notes

Le traitement anti-VIH est recommandé à toutes les personnes qui ont un taux de CD4 inférieur à 350 et qui se sentent prêtes à commencer. C'est particulièrement recommandé si votre taux de CD4 est inférieur à 200.

Votre médecin ou autre personnel médical pourra répondre à vos questions sur le traitement du VIH et vous aider à déterminer si vous êtes prêt(e) à commencer.

Certaines personnes commencent le traitement anti-VIH avec un taux de CD4 supérieur à 350. Votre médecin peut vous le recommander si :

- Le VIH vous rend malade
- Vous avez d'autres problèmes de santé comme une hépatite ou du diabète
- Vous courez un risque élevé de maladie cardiaque
- Vous avez plus de 50 ans, ou
- Vous sortez avec quelqu'un qui n'est pas séropositif (le traitement réduit le risque de transmission du VIH).



Ce matériel se base sur une publication soumise au copyright original de NAM, organisation sans but lucratif du VIH, qui a son siège au Royaume Uni. La publication originale est disponible sur www.aidsmap.com. La traduction de ce matériel a été réalisée avec l'autorisation de NAM.



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

Subvencio-
nado por:



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Programa de Prevenció i
Assistència de la Sida



Àrea d'Acció Social y Ciutadania



Àrea de Benestar Social

Colaboran:



POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR