



Le risque de transmettre le VIH est moins important si votre charge virale est indétectable grâce au traitement antirétroviral.



Il y a moins de probabilité que vous transmettiez le VIH si:


Si votre charge virale est restée "indétectable" pendant plusieurs mois. Cela signifie qu'il existe seulement une petite quantité de VIH dans le sang.



Il est important que vous vérifiez votre charge virale régulièrement.

et

Si vous prenez toutes les doses de votre traitement antirétroviral au bon moment et aux quantités adéquates.



Si vous ne le faites pas, votre charge virale pourrait augmenter.

et

Si ni vous ni votre partenaire n'avez une infection sexuellement transmissible.



Il est important d'effectuer des examens de santé sexuelle régulièrement.

Si ces circonstances sont réunies, est-il possible que le VIH se transmette?

Oui, la transmission du VIH peut encore se produire.



Il est plus probable que cela se produise lors du sexe anal sans protection que pendant d'autres types de relations sexuelles.



Même s'il existe chaque fois plus d'indices scientifiques établissant que le traitement réduit le risque de transmission du VIH, la recherche dans ce domaine reste ouverte.

A souligner

- L'usage approprié des préservatifs est le moyen le plus fiable de prévenir la transmission du VIH.
- Un traitement efficace du VIH réduit aussi le risque de transmission du virus.
- Le personnel médical devrait vous conseiller ainsi qu'à votre partenaire sur la façon d'éviter la transmission, à partir de vos propres circonstances personnelles.