

Il existe beaucoup de fausses idées autour du VIH et du Sida. Tout ce que vous entendez sur le VIH et le SIDA n'est pas toujours vrai. Cette fiche vous aidera à faire la différence entre mythe et réalité.




Les personnes vivant avec le VIH transmettent l'infection lors de chaque rapport sexuel.

100%



Les médicaments antirétroviraux sont plus nocifs que bénéfiques.



De la même façon d'une femme ne tombe pas enceinte lors de chaque rapport sexuel, le VIH lui non plus ne se transmet pas chaque fois.

Si vous utilisez un préservatif convenablement, il n'existe presque aucun risque de transmission du VIH. Si la personne vivant avec le VIH prend aussi des médicaments antirétroviraux, ce risque est même inférieur.



Sans médicaments antirétroviraux, la majeure partie des personnes vivant avec le VIH, tomberaient gravement malade, ils développeraient le sida et mourraient jeunes.


Le traitement, s'il est pris au bon moment, permettra que les personnes puissent profiter d'une vie longue et saine. La majeure partie des effets secondaires disparaissent après quelques semaines et sont sans conséquence à long terme.



Les suppléments nutritionnels et les plantes peuvent être aussi efficaces que les médicaments antirétroviraux.



Vous ne pouvez pas vous infecter par le VIH si vous êtes marié.



Certaines remèdes à base de plantes et autres suppléments peuvent être bénéfiques pour votre santé en général, mais ils ne peuvent éviter que le VIH n'infecte de nouvelles cellules et ne se propage.

Seuls les médicaments antirétroviraux ont démontré, essais scientifiques à l'appui, être capables de prévenir la propagation du VIH dans l'organisme. De plus, certains suppléments à base de plantes empêchent certains antirétroviraux de fonctionner correctement. Ils peuvent, par exemple, réduire la quantité de médicament qui arrive au sang, le rendant moins efficace contre le VIH.



Malheureusement, des millions de personnes mariées ou ayant des relations stables et durables contractent le VIH.

Cela arrive parfois lorsqu'un des membres du couple avait déjà le VIH avant de se connaître. Cela arrive aussi lorsqu'un membre du couple a été infidèle et a eu des relations sexuelles sans protection.

nam

Esta ficha se basa en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino Unido. La publicación original está disponible en www.aidsmap.com. La traducción de este material se ha realizado con la autorización de NAM.

grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencionado por:

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Programa de Prevenció i
Assistència de la Sida

Ajuntament de Barcelona
Qualitat de vida, Igualtat i Esports

Diputació de Barcelona
Serveis de Benestar Social

Colaboran:

