


Existem argumentos a favor e contra iniciar logo ou deixar para mais tarde o tratamento da hepatitis C.

Motivos para adiar o tratamento:

O tratamento contra a hepatitis C **nem sempre funciona**.



Nos próximos anos, estarão à disposição **novos e melhores fármacos**.



Os **efeitos secundários**, como a sensação de cansaço, malestar e mudanças de humor, podem ser graves, ainda que variem de uma pessoa para outra.



É possível que deseje atrasar o tratamento:

Se tiver **outras prioridades** no momento, como o trabalho ou as relações pessoais.



Se vê que seria difícil agora tomar **todas as doses** dos medicamentos como deve ser.



Se você ou o seu parceiro/a **esperam um filho ou se a gravidez se produzir** durante o tratamento.



Se tiver uma **estirpe** do vírus da hepatitis C (genótipos 1 ou 4) mais difíceis de tratar com os fármacos atuais.



Motivos para iniciar já o tratamento:

O tratamento pode melhorar a sua saúde e evitar que se produzam danos no fígado.



Se o tratamento tiver êxito, **irá curá-lo da hepatite C.**



Após um tratamento bem sucedido, deixará de existir risco de **transmitir a hepatite C** a outra pessoa.



O tratamento não é para sempre. Em geral, dura **6, 12 ou 18 meses.**



É possível que seja uma boa ideia iniciar já o tratamento:

Se se infectou **há menos de seis meses**, dado que neste caso o tratamento tem mais probabilidades de ter êxito.



Se tiver uma **estirpe** do vírus da hepatite C (genótipos 2 ou 3) que é mais fácil de curar.



Se o seu fígado estiver **muito danificado** (necessidade de tratamento com urgência).



Notas:

Pode tomar fármacos contra a hepatite C e o VIH ao mesmo tempo, mas é recomendável **não iniciar** os dois tratamentos ao mesmo tempo.

Se o seu fígado estiver mais débil que o seu sistema imunitário, é melhor iniciar primeiro o tratamento da hepatite C e começar a terapêutica do VIH depois.

Se o seu sistema imunitário estiver mais débil que o seu fígado, é melhor iniciar primeiro o tratamento do VIH e associar a terapêutica da hepatite C depois.

Se já está estabilizado com um tratamento contra o VIH, é melhor continuar com ele e começar o tratamento contra a hepatite C quando for necessário.

Alguns medicamentos para o VIH não são adequados para as pessoas que tomam medicamentos para a hepatite C, mas existem alternativas disponíveis.

Gravidez: o fármaco ribavirina pode causar danos no feto. Se você ou o seu parceiro/a tomaram ribavirina nos últimos seis meses, deverá/ão utilizar contraceptivos para evitar uma gravidez.

A destacar:

- Decidir qual o melhor momento para iniciar o tratamento da hepatite C não é fácil.
- É importante receber apoio e assessoria para a tomada desta decisão.