



S-ar putea să nu fie necesară începerea tratamentului pentru HIV chiar imediat. Depinde de efectul virusului pricinuit asupra sistemului tău imunitar.


- 1** Sistemul imunitar este mecanismul natural de apărare al corpului. Când este puternic, poate să opună rezistență prin el însuși în fața bolilor și a infecțiilor.




- 2** Renumărarea de CD4 este o analiză de sânge care proporționează informații asupra sistemului imunitar. Deținerea unui nivel ridicat de CD4 dovedește că sistemul imunitar este puternic.



- 3** Dacă nivelul de renumărare a CD4 este scăzut, înseamnă că sistemul imunitar a fost debilitat din cauza HIV-ului.




- 4** Dacă renumărarea de CD4 au nivelul sub 350 celule/mm<sup>3</sup>, se recomandă începerea tratamentului.



- 5** Urmarea unui tratament antiretroviral implică luarea pastilelor zi de zi și la aceeași oră. Ar trebui să te simți pregătit pentru ducerea la bun sfârșit a respectivului angajament.



- 6** Tratamentul anti-HIV va întări sistemul tău imunitar și îl va pregăti pentru a putea din nou opune rezistență bolilor și infecțiilor.



**nam**

Acest material este bazat pe o publicație cu copyright original al NAM, organizație non-profit asupra HIV, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii. Publicația originală este disponibilă în [www.aidsmap.com](http://www.aidsmap.com). Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizația NAM.



grupo de trabajo sobre  
tratamientos del VIH  
contact@gtt-vih.org  
www.gtt-vih.org  
Barcelona (España)

Subvencio-  
nado por:



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Programa de Prevenció i  
Assistència de la Sida



Àrea d'Acció Social y Ciutadania



Àrea de Benestar Social

Colaboran:



## POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

## De remarcat

- **Recomandȃrile medicale spaniole sfȃtuiesc ca tratamentul sȃ se iniȃieze ȃn momentul cȃnd renumȃrarea de CD4 este sub 350 celule/mm<sup>3</sup>.**
- **Luarea tratamentului va evita continuarea dȃunȃrii ȃn sistemul imunitar, ceea ce ȃnseamnȃ cȃ vei putea avea mai puȃine riscuri de ȃnbolnȃvire ȃn viitor.**

## Notiȃe

Se recomandȃ ca toȃi acei pacienȃi care au renumȃrarea de CD4 la un nivel inferior a 350 celule/mm<sup>3</sup> ȃi se simt pregȃtiȃi, sȃ treacȃ la iniȃierea tratamentului antiretroviral . Se sfȃtueȃte ȃn mod special cȃnd nivelul de CD4 se gȃseȃte sub 200 celule/mm<sup>3</sup>.

Personalul medic sau cel sanitar care ȃȃi dȃ atenȃie ȃȃi vor putea rȃspunde la orice ȃndoialȃ sau nelȃmurire ai putea avea cu respect la tratamentul HIV. ȃi deasemenea te vor putea ajuta la luarea deciziei ȃn cazul ȃn care ai fi pregȃtit pentru ȃnceperea lui.

ȃn unele cazuri, pacienȃii ȃncep tratamentul cȃnd renumȃrarea lor de CD4 depȃeȃte nivelul de 350 celule/mm<sup>3</sup>. Ar fi posibil ca medicul tȃu sȃ ȃi-l recomande ȃn cazurile cȃnd:

- HIV-ul ȃȃi provoacȃ ȃnbolnȃvirea
- Ai putea avea alte probleme de sȃnȃtate, cum ar fi hepatita sau diabetul.
- Ai avea un risc mai ridicat ȃn faȃa bolilor cardiace.
- Vȃrsta ta depȃeȃte de 50 de ani, sau
- Ai fi ȃn momentul respectiv, ȃntr-o relaȃie cu o persoanȃ care nu are HIV-ul (tratamentul reduce riscul de transmitere a virusului).



Acest material este bazat pe o publicaȃie cu copyright original al NAM, organizaȃie non-profit asupra HIV, cu sediul ȃn Regatul Unit al Marii Britanii. Publicaȃia originalȃ este disponibilȃ ȃn [www.aidsmap.com](http://www.aidsmap.com). Traducerea acestui material a fost realizatȃ cu autorizaȃia NAM.



grupo de trabajo sobre  
tratamientos del VIH  
contact@gtt-vih.org  
www.gtt-vih.org  
Barcelona (Espaȃa)

## POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencionado por:



Colaboran:

