


Pe lângă faptul de a ține infecția HIV sub control, medicamentele antiretrovirale deasemenea pot să afecteze corpul dumneavoastră sub altă formă. Oricare ar fi efectul adițional sau nedorit sunt cunoscute ca "efecte secundare".

Efectele secundare tranzitorii

Efectele secundare mai comune sunt datorate procesului de adaptare al organismului la noul medicament. De obicei, după câteva săptămâni, aceste efecte adverse dispar.




De multe ori, se pot lua alte medicamente pentru a limita aceste efecte secundare. Uneori, anumite efecte nu scad. Dacă acesta e cazul dumneavoastră, puteți consulta cu medicul asupra posibilității de schimbare a tratamentului.


Efectele secundare prelungite

Efectele secundare care ar avea consecințe de durată pentru sănătatea dumneavoastră sunt mai puțin obișnuite.


● La spital vi se vor face probe periodice pentru a verifica dacă ficatul, rinichii și oasele vă sunt în stare bună. Dacă aveți îndoieli, asupra vreunei probe anume puteți cere să vi se explice rolul probei.



● Deasemenea ar trebui să vă faceți probe pentru a verifica nivelele colesterolului și a glucozei. O cantitate ridicată ar putea însemna un risc mai mare de a suferi boli cardiace, diabet, hipertensiune sau un accident vascular cerebral.



● Schimbările formelor corporale (pierderea sau acumularea grăsimilor în zone determinate) sunt mai puțin obișnuite decât în trecut. În actualitate, medicii evită folosirea acelor medicamente care ar putea provoca aceste probleme.



În cazul în care vi se ivește vreo problemă, ar fi recomandabil realizarea unor schimbări în stilul de viață, luarea unui tratament adițional sau schimbarea regimului anti-HIV care îl luați.



Acest material se bazează pe o publicație cu copyright original de NAM, organizație non-profit al HIV, cu sediul în Marea Britanie. Publicația originală este disponibilă în www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizarea NAM.



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencionado por:



Colaboran:



A remarca

- Efectele secundare mai obișnuite sunt trecătoare și de multe ori se pot trata cu medicamente.
- Efectele secundare de largă durată sunt mai puțin întâlnite.
- În cazul în care efectele v-ar provoca probleme, ar fi bine să vorbiți cu medicul asupra situației. S-ar putea să fie posibilă schimbarea tratamentului.

Notițe

Reacții alergice

- Există două clase de medicamente antiretrovirale care sunt cunoscute ca provocatoare a alergiei, în primele zile sau chiar primele săptămâni de luare a tratamentului. Dar este întâlnit, doar într-un număr redus de persoane.
- Simptomele cel mai des întâlnite sunt erupțiile pe piele (cutanate), dar medicul dumneavoastră vă va putea oferi mai multe informații în legătură cu simptomele cărora ar trebui să li se dea mai multă atenție.
- Dacă ați avea aceste simptome, este neapărat nevoie de ajutor medic de formă urgentă.
- Cele două medicamente la care ne referim sunt: abacavir (Ziagen®, Kivexa®, Trizivir®) și nevirapina (Viramune®).

nam

Acest material se bazează pe o publicație cu copyright original de NAM, organizație non-profit al HIV, cu sediul în Marea Britanie. Publicația originală este disponibilă în www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizarea NAM.



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

POR FAVOR, FOTOCOPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencio-
nado por:



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Programa de Prevenció i
Assistència de la Sida



Àrea d'Acció Social y Ciutadania



Àrea de Benestar Social

Colaboran:

