


Există un risc mai scăzut de transmitere a HIV în cazul în care încărcătura virală este nedetectabilă din cauza terapiei antiretrovirale.



Este mai puțin probabil de a transmite HIV în cazul în care:


Încărcătura virală se menține 'nedetectabilă' pe timpul mai multor luni. Acest lucru înseamnă că există doar o cantitate mică de HIV în sânge.



Este important să se verifice încărcătura virală periodic.

și

Să luați toate dozele de tratament antiretroviral la momentul potrivit și în cantitățile adecvate.



Dacă nu respectați recomandările, încărcătura virală ar putea crește.

și


Nici dumnevoastră nici partenerul/a dv. aveți o infecție de transmitere sexuală.



Este importantă realizarea controalelor de sănătate sexuală în mod regulat.

Dacă există astfel de circumstanțe, este posibil ca HIV să se transmită?

Da, transmiterea HIV poate să se transmită în continuare.



Este mult mai probabil să apară în timpul sexului anal fără protecție decât în alte tipuri de practici sexuale.



Deși există dovezi științifice că tratamentul reduce riscul de transmitere a HIV, cercetarea asupra acestei teme continuă deschisă.

A se remarca

- Utilizarea corectă a prezervativelor este calea cea mai sigură de prevenire a transmiterii HIV.
- Tratamentul eficient de HIV de asemenea reduce riscul de transmitere al virusului.
- Personalul medical ar trebui să vă ofere consultanță atât dumnevoastră cât și partenerului/ei asupra cum trebuie evitată transmiterea, în funcție de propriile circumstanțe personale.