

### نشریات کے بچے کی والدہ سے InfoVIHtal #43

#### نشریات کے بچے کی والدہ سے

ایچ ائی وی سے یونٹ ڈرنک کرتے ہیں ایک عورت کو اس کے بیٹے کے ساتھ تو ایچ ائی وی سے بارداری کیا ہے میں کمی VIH بیشتر معاملات میں خیال ہے کہ کے دوران دونوں کے عنوان کے دوران یا نرسنگ حالیہ ہفتوں کے دوران بارداری یا ہوتا ہے

کے ذریعے 1% جب تک کے خطرے کی والدہ سے رابطہ کرنے کے لئے ایک بچے کم ہو سکتا ہے، تاہم اور چارہ کار بنانے کی منصوبہ کے مناسب استعمال رجعی اینٹی وائرل بيمرجک فیور کے دوران اہم ہے بندی جیسے بڑا اپریشن سیکشن یا اہم میں وائرل بيمرجک فیور کے مقدمہ بوجھا دکھائی نہیں دے رہا اور سینے کے

#### عوامل میں مزید اضافے کا خطرہ

مزید پھیلنے سے ایچ ائی وی کی والدہ اگر ایچ ائی وی انفیکشن ہے یا اگے بڑھنے ایڈز ہے یا دھوپ کچھ گھنٹے پہلے بچے کی 4 پانی کے کم از کم رخصت کاؤنٹ cd4 ہائی وائرل بيمرجک فیور بوجھا یا کم پیدائش مشکل ہے۔ بالمقابل ایک جیسے بڑا اپریشن کا منصوبہ (اس نے ایک فرج کا جنم سیکشن پیدائش 37) مثال کے طور پر کلامانڈیا، چھوڑنے یا چمٹی ہے ایک زیریں علاقوں انفیکشن episiotomy . دوران حمل ادویات یا دا کو سینے کے بچے ہیں InfoVIHtal 37 کلامانڈیا دیکھ

#### سینے دین

اگر وائرل بيمرجک فیور 29% سے اپنا دودھ پلانے اور ی جولائی ہفتہ 9% اس انفیکشن کا خطرہ میں ہے بچی دودھ کا دودھ اور اس مقدمہ میں یہ چگانا بوجھا ہے کیوں کہ سفارش پر سختی سے عمل نہیں ہے میں چیک اپ کی صحت مرکز ہے۔ قرابہ بدستور فنلینڈ کے ایشن ہوتا ہے

#### کو روکنے کے لئے جانیں کی ماں کی نشریات سے بچے

تاہم یہ اپ کا ڈاکٹر اور صفائی کے آلات کے سلسلے میں ہے۔ یہ انتہائی ہمیشہ شامل کی سفارش کی ہے کم نہیں اور لوڈ، وائرل بيمرجک فیور کاؤنٹ cd4 اچھا ہے کہ اپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک اچھی شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ایچ ائی وی کے انفیکشن کے قوانین کی حافل کی سفارش کی ہے کہ آپ کو اپ کی ضرورت (تیسری سہ ماہی) میں دیر سے تین ماہ اپ کی پریگنسی (azt (zidovudine) شروع اور کھچاؤ پیدا ہوگا، ہوتا ہے اور اس کی سیکشن جیسے بڑا اپریشن azt بھی وصول کرنے کا انجکشن کے ایک ایشن کے دوران ایک چھوٹے عرصے رجعی علاج اینٹی وائرل بيمرجک فیور جٹھا ڈلیوری نہیں ہے اس کیس میں اختیار ml سے زائد کاپیاں بوجھ کم کرنے 50 گزشتہ ماہ کے حمل وائرل بيمرجک فیور سے مہینے اور علاج کے، ہے کہ آپ کی منصوبہ بندی کا بھی محسوس کرتی ہو کہ آپ دلوری ہے بی مہینے ہفتوں کے زندگی ہے 4 کی شکل میں شربت کے پہلے azt

اگر آپ کو اچھی صحت کے ٹاپ اپ کی پریگنسی لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے لے کر آپ ایچ ائی وی لادی وائرل بيمرجک فیور نہیں اور رجعی علاج اینٹی وائرل بيمرجک فیور کا مقصد تو آپ کو کیا جائے گا یہ دونوں پارٹیوں کی سفارش پر رکھنے کے علاج کے بعد ہوتا ہے اور آپ کا ہے بی دکھائی دیتا ہے azt مہینے علاج کے، مہینے

تو اس کا علاج شروع رجعی اینٹی وائرل، ہائی وائرل بيمرجک فیور لوڈ شیڈنگ کی سفارش کی ہے پاسنگ 3tc (lamivudine, epivir) اور azt ترکیب nucleo دو طرح کے، بيمرجک فیور پر مشتمل ہے پریگنسی (ہم) protease یا (®) پاسنگ nucleoside nevirapine (viramune) اور کوئی یکساں (®) کے دوران اعلیٰ وائرل بيمرجک فیور لوڈ شیڈنگ شروع کردیے دیتا تو اس کی جتنی جلدی تشخیص علاج اگر آپ کو اب بھی ایک وائرل بيمرجک فیور بوجھا دکھائی دینے سے۔ اینٹی وائرل بيمرجک فیور رجعی لیکن اگر آپ لوڈ شیڈنگ وائرل بيمرجک فیور سے، قبل جنم ہے تو یہ ایک اچھا سیکشن جیسے بڑا اپریشن



اپ دلوری فرج کا ایک منصوبہ ، ہیں وہاں کوئی مسائل پیٹ میں پہنچ گئے ہیں ml کاپیاں / 50 نیچے ہے ہے۔

اگر اپ حاملہ ہیں جبکہ ان کے علاج اینٹی وائرل ہیمرجک فیور کے رجعی کی سفارش کی ہے کہ اپ کے سے سودھنا ہے 20 اور 18 ایک ٹیسٹ کی ضرورت کو کاڑھنا پیدائشی خامیاں ہفتوں میں . علاج جاری ہے کہ ترقی کی مضغہ .

اگر اپ حاملہ ہیں جبکہ تم قیام کر رجعی اینٹی وائرل ہیمرجک فیور سے کم ہے لیکن ناکام اپ لوڈ شیڈنگ اپ کو مزاحمت کاروں کے ایک ٹیسٹ کے تعین اور بہترین ہیں ، وائرل ہیمرجک فیور کے اٹار نمایاں نہیں وائرل ہیمرجک فیور نے لوڈ شیڈنگ کی پیدائش میں نہیں . اس مقصد کے لئے کیا جائے . کہ تبدیلی ہے سے سودھنا ہے 20 اور 18 ایک ٹیسٹ کی ضرورت کو کاڑھنا پیدائشی خامیاں ہفتوں میں . دکھائی دیتا ہے اپ کے بچے کے علاج معالجے کے لئے رجعی اینٹی وائرل ہیمرجک فیور کے ساتھ . کہ ترقی کی مضغہ . فارم شربت کے وائرس نہیں اپ مانع کے پہلے چار ہفتوں میں زندگی ہے

اگر اپ ایچ ائی وی انفیکشن کو تشخیص کے ساتھ اپ کی پریگنسی بہت دیر سے شروع کرنے کے لئے ایک تجزیے کے خون کے تعین میں مزاحمت . فوری طور پر علاج اینٹی وائرل ہیمرجک فیور رجعی سب سے زیادہ عام استعمال ہونے والی اس . کاروں کے انتخاب کے لیے وائرس منشیات زیادہ مناسب ہے اپ کا بچہ علاج سے میں . کیونکہ ان کے جسم کے کھیڑی اور مضغہ , nevirapine اور 3tc , azt مقدمہ شربت کے پہلے چار ہفتوں میں زندگی ہے

انجکشن کے azt یا اپ کے لئے ملنی چاہئے ، اگر اپ ایچ ائی وی انفیکشن کو تشخیص کے بعد ہوتا ہے 4 اپ کے بچہ کی ضرورت بھی تگنا جگتی منشیات کے . nevirapine اور 3tc جراثیم انجیکٹ اور ذہنی ہفتوں کے لئے

پاسنگ efavirenz (sustiva) ظاہری اینٹی وائرل ہیمرجک فیور رجعی . پیدائش کے وجہ سے خطرہ نہیں دوران حمل یا اگر اپ حاملہ دھونگ رچنے قیام (®)

### جیسے بڑا اپریشن کے سیکشن

اس کا امکان کم ہے کہ اگر وبا کی بچی ہے جیسے بڑا اپریشن کی طرف سے کئے جانے والے سیکشن کی کے "معلوم ہوا ہے کہ انتخابی جیسے بڑا اپریشن سیکشن . منصوبہ بندی کرنے کے بجائے بیانت فرج کا ہے یا اگر بچہ اس سے قبل شروع جیسے بڑا اپریشن 38 لئے منصوبہ بندی کی ہے اور ہفتے جلد از جلد مزید سے کچھ خطرہ سیکشن کو ماں ہے

اگر ایک خاتون کا علاج اینٹی وائرل ہیمرجک فیور کے رجعی بڑی مستعدی اور تکلیف دہ وائرل ہیمرجک فیور لوڈ شیڈنگ دکھائی نہیں یا بہت کم وقت میں ہوتا ہے بیانت فرج کا اپشن کی منصوبہ بندی کی ہے

مزید معلومات کے لئے اپ مندرجہ ذیل میں اپ کے استفسار فون

gTt: 93 458 26 41

Creación Positiva: 93 431 45 48

Red2002: 93 458 49 60

ADHARA: 954 981 603

UNAPRO: 922 63 29 71



grupo de trabajo sobre  
tratamientos del VIH  
e-mail: contact@gtt-vih.org  
website: www.gtt-vih.org

**POR FAVOR, FOTOCOPIALO Y HAZLO CIRCULAR**

Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut  
Pla Director d'Immigració



FUNDACIÓN  
**RENATA**

Subvencionado por:



Secretaría del Plan  
Nacional sobre el Sida