




























Nombre genérico	N. comercial	Formulación	Dosis estándar en adultos	Pastillas/día	Principales efectos secundarios	Restricciones alimentarias
Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (ITIN)						
3TC, lamivudina	<i>Epivir</i>	 <i>Comprimidos de 150* y 300mg</i>	150mg dos veces al día o 300mg una vez al día	2 1	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal, insomnio, exantema (<i>rash</i>), cansancio	Se puede tomar con o sin comida
Abacavir	<i>Ziagen</i>	 <i>Comprimidos de 300mg</i>	300mg dos veces al día o 600mg una vez al día	2	Habituales: Exantema (<i>rash</i>), náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito, cansancio Raros: Reacción de hipersensibilidad	Se puede tomar con o sin comida
AZT, zidovudina	<i>Retrovir</i>	 <i>Cápsulas de 100 y 250mg*</i>	250mg dos veces al día	2	Habituales: Náuseas, vómitos, fatiga, dolor de cabeza, mareos, debilidad, dolor muscular Raros: Anomalías sanguíneas, lipotrofia	Se puede tomar con o sin comida
d4T, estavudina	<i>Zerit</i>	 <i>Cápsulas de 15, 20, 30 y 40mg*</i>	Personas + 60kg: 40mg dos veces al día Personas - 60kg: 30mg dos veces al día	2	Habituales: Lipotrofia, neuropatía periférica, náuseas, diarrea, dolor abdominal, mareos, cansancio, exantema (<i>rash</i>) Raros: Pancreatitis	Se puede tomar con o sin comida
ddI, didanosina	<i>Videx</i>	 <i>Comprimidos de 25, 50, 100, 150 y 200mg*</i>	Personas de más de 60kg: 400mg una vez al día o 200mg dos veces al día Personas de menos de 60kg: 250mg una vez al día o 125mg dos veces al día	2 ó 4 (masticadas o disueltas en agua)	Habituales: Neuropatía periférica, náuseas, vómitos, diarrea, exantema (<i>rash</i>) Raros: Pancreatitis	Tomar al menos dos horas después y 30 minutos antes de comer
ddI, didanosina (liberación prolongada)	<i>VidexEC</i>	 <i>Cápsulas de 125, 200, 250 y 400mg*</i>	Personas de más de 60kg: 400mg una vez al día o 200g dos veces al día Personas de menos de 60kg: 250mg una vez al día o 125mg dos veces al día	1 ó 2	Habituales: Neuropatía periférica, náuseas, vómitos, diarrea, exantema (<i>rash</i>) Raros: Pancreatitis	Tomar al menos dos horas después y dos horas antes de comer o beber algo que no sea agua
FTC, emtricitabina	<i>Emtriva</i>	 <i>Cápsula de 200mg</i>	200mg una vez al día	1	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, mareos, debilidad, exantema (<i>rash</i>)	Se puede tomar con o sin comida
Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleótidos (ITINt)						
Tenofovir	<i>Viread</i>	 <i>Comprimido de 300mg</i>	300mg una vez al día	1	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, mareos, bajos niveles de fosfato en sangre Raros: Problemas renales	Se puede tomar con o sin comida
Combinaciones en dosis fija de ITIN/ITINt						
3TC / AZT	<i>Combivir</i>	 <i>Comprimido con 150mg de 3TC y 300mg de AZT</i>	Una pastilla dos veces al día	2	Véase 3TC y AZT	Se puede tomar con o sin comida
3TC / abacavir / AZT	<i>Trizivir</i>	 <i>Comprimido con 150mg de 3TC, 300mg de abacavir y 300mg de AZT</i>	Una pastilla dos veces al día	2	Véase 3TC, abacavir y AZT	Se puede tomar con o sin comida
3TC / abacavir	<i>Kivexa (UE)</i>	 <i>Comprimido con 300mg de 3TC y 600mg de abacavir</i>	Una pastilla una vez al día	1	Véase 3TC y abacavir	Se puede tomar con o sin comida
FTC / tenofovir	<i>Truvada</i>	 <i>Comprimido con 200mg de FTC y 300mg de tenofovir</i>	Una pastilla una vez al día	1	Véase FTC y abacavir	Se puede tomar con o sin comida
Combinaciones en dosis fijas de ITIN/ITINt/ITINN						
FTC / tenofovir / efavirenz	<i>Atripla</i>	 <i>Comprimido con 600mg de efavirenz, 200mg de FTC y 300mg de tenofovir</i>	Una pastilla una vez al día	1	Véase FTC, tenofovir y efavirenz	Tomar sin comida
Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos (ITINN)						
Efavirenz	<i>Sustiva (UE)</i>	 <i>Comprimido de 600mg* y cápsula de 200mg</i>	600mg una vez al día	1	Habituales: Exantema (<i>rash</i>), mareos, problemas de sueño, sueños anómalos, problemas de concentración, náuseas, dolor de cabeza, cansancio Raros: Depresión, psicosis	Se puede tomar con o sin comida
Nevirapina	<i>Viramune</i>	 <i>Comprimido de 200mg</i>	200mg una vez al día durante dos semanas y después 400mg una vez al día o 200mg dos veces al día	2	Habituales: Toxicidad hepática, reacción alérgica, exantema (<i>rash</i>), náuseas, dolor de cabeza Raros: Síndrome de Stevens Johnson	Se puede tomar con o sin comida
Inhibidores de la proteasa						
Atazanavir	<i>Reyataz</i>	 <i>Cápsulas de 100, 150 y 200mg</i>	300mg con 100mg de ritonavir una vez al día	2 [§]	Habituales: Náuseas, diarrea, exantema (<i>rash</i>), dolor abdominal, dolor de cabeza, hiperbilirrubinemia	Tomar con comida
Darunavir	<i>Prezista</i>	 <i>Comprimido de 300mg</i>	600mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	6 [§]	Habituales: Diarrea, náuseas, dolor de cabeza	Tomar con comida
Fosamprenavir	<i>Telzir</i>	 <i>Comprimido de 700mg</i>	700mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	4 [§]	Habituales: Lipodistrofia, náuseas, vómitos, diarrea, exantema (<i>rash</i>), dolor abdominal, dolor de cabeza, mareos, cansancio, hormigueos en la zona de la boca	Se puede tomar con o sin comida
Indinavir	<i>Crixivan</i>	 <i>Cápsulas de 200, 333 y 400mg*</i>	800mg tres veces al día	6	Habituales: Piedras en los riñones, dolor abdominal, anomalías hepáticas, lipodistrofia, dolor muscular, náuseas, vómitos, diarrea, exantema (<i>rash</i>), dolor de cabeza, sequedad en piel y boca, cansancio	Tomar una hora antes o dos horas después de comer o acompañada de un aperitivo ligero poco grasiento
Lopinavir / ritonavir	<i>Kaletra Aluvia (en entornos con pocos recursos)</i>	 <i>Comprimido con 200mg de lopinavir y 50mg de ritonavir</i>	Dos pastillas dos veces al día	4	Habituales: Lipodistrofia, aumento de las enzimas hepáticas, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, exantema (<i>rash</i>), cansancio, debilidad, dolor de cabeza	Se puede tomar con o sin comida
Nelfinavir	<i>Viracept</i>	 <i>Comprimido de 250mg</i>	1250mg dos veces al día o 750mg tres veces al día	10 9	Habituales: Lipodistrofia, náuseas, vómitos, diarrea	Tomar con comida
Ritonavir	<i>Norvir</i>	 <i>Cápsula de 100mg</i>	Dosis completa: 600mg dos veces al día Para "potenciar" a otros IP: 100 - 200mg una o dos veces al día	12 1 - 4	Habituales: Lipodistrofia, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor muscular, dolor de cabeza, debilidad, insensibilidad alrededor de la boca	Tomar con comida para evitar las náuseas
Saquinavir	<i>Invirase</i>	 <i>Cápsula de 200mg y comprimido de 500mg*</i>	1000mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	6 [§]	Habituales: Lipodistrofia, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor muscular, dolor de cabeza, exantema (<i>rash</i>), fiebre, cansancio, mareos	Tomar en las dos horas siguientes después de una comida
Tipranavir	<i>Aptivus</i>	 <i>Cápsula de 250mg</i>	500mg con 200mg de ritonavir dos veces al día	8 [§]	Habituales: Lipodistrofia, náuseas, diarrea, dolor abdominal	Tomar con comida
Inhibidor de la fusión						
T-20, enfuvirtida	<i>Fuzeon</i>	 <i>Polvo para disolver en agua tamaño reducido</i>	Inyección de 90mg bajo la piel dos veces al día		Habituales: Reacción en el punto de inyección, infecciones del tracto respiratorio	Sin restricciones de comida
Inhibidor del CCR5						
Maraviroc	<i>Celsentri</i>	 <i>Comprimidos de 150 y 300mg</i>	300mg dos veces al día, 150mg dos veces al día con todos los IP potenciados con ritonavir, excepto fosamprenavir y tipranavir, 600mg dos veces al día con efavirenz	2 - 4	Habituales: Dolor de cabeza, mareos, náuseas, debilidad, flatulencia	Se puede tomar con o sin comida
Inhibidores de la integrasa						
Raltegravir	<i>Isentress</i>	 <i>Comprimido de 400mg.</i>	400mg dos veces al día	2	Habituales: Dolor de cabeza, diarrea, náuseas	Se puede tomar con o sin comida

* Formulación/es mostrada/s.
§ Incluyendo la/s cápsula/s de ritonavir.

Los editores han tomado todas las precauciones razonables en la elaboración de esta publicación. Ni NAM ni los editores pueden ser hechos responsables de cualquier imprecisión o declaración errónea sobre cuestiones que estén más allá de su control. La inclusión de información sobre cualquier acuerdo o terapia no implica la aprobación de los mismos por parte de NAM o los editores. La información siempre debería emplearse acompañada de un asesoramiento médico profesional.