

Toma de fármacos antituberculosos

NOMBRE DEL FÁRMACO	EFFECTOS ADVERSOS	CONSEJOS PARA TOMARLOS	INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS
Rifampicina	Exantema cutáneo (<i>rash</i>), fiebre, problemas de estómago y coloración anaranjada de la piel, orina, heces y lágrimas (no se deben usar lentillas mientras se tome el fármaco)	Tomar con el estómago vacío entre 30 minutos y una hora antes de la comida	Reduce los niveles de los inhibidores de la proteasa (IP) y de los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido (ITINN) en la sangre. Reduce los niveles sanguíneos de atovacuona (usada para tratar la PCP). Puede reducir los niveles sanguíneos de metadona hasta en un 50%. También puede reducir los niveles del antifúngico ketoconazol.
Isoniazida	Fiebre, exantema cutáneo (<i>rash</i>), neuropatía periférica y problemas hepáticos. La vitamina B6 (piridoxina) reduce el riesgo de neuropatía periférica. Evitar el consumo de alcohol puede ayudar a reducir el riesgo de problemas hepáticos.	Tomar con el estómago vacío como mínimo entre 30 minutos y una hora antes de comer.	Es necesario precaución si se toma junto a antirretrovirales que causan neuropatía periférica, particularmente d4T (estavudina, Zerit®) y ddl (didanosina, Videx®).
Pirazinamida	Inflamación hepática (hepatitis) y debería usarse con precaución en casos de personas con un historial de problemas hepáticos. También puede causar molestias estomacales, exantema cutáneo y gota.	Beber mucha agua ayuda a reducir el riesgo de padecer molestias estomacales.	Debería tomarse 2 horas antes de ddl.
Etambutol	Inflamación del nervio óptico, visión distorsionada, fiebre y exantema cutáneo (<i>rash</i>). Si desarrollas problemas de visión mientras estés tomando etambutol, contacta con tu médico inmediatamente. Riesgo de reacción alérgica. Puede causar problemas de oído y daños renales.	Tomar con comida para reducir el riesgo de náuseas.	
Claritromicina	Problemas estomacales, náuseas y alteraciones en el sentido del gusto. Debería ser usado con precaución por personas con problemas de hígado y riñón.		Rifabutina reduce los niveles sanguíneos de claritromicina, mientras que claritromicina aumenta los niveles de rifabutina.
Dapsona	Náuseas y exantema cutáneo (<i>rash</i>)	Tomar con comida para reducir el riesgo de náuseas.	Debería ser tomado dos horas antes de ddl.
Ofloxacino	Dolor de cabeza, mareos, ansiedad, temblores, molestias estomacales y aftas		
Rifabutina	Exantema cutáneo (<i>rash</i>), fiebre, náuseas, inflamación hepática, leucopenia (disminución del recuento de glóbulos blancos), trombocitopenia (disminución del número de plaquetas) e inflamación alrededor del ojo al usarse junto a claritromicina y etambutol.	Puede tomarse con o sin comida.	Puede presentar interacciones complejas con los IP y los ITINN. Tu médico ajustará las dosis si es necesario y te someterá a un seguimiento minucioso.
Estreptomina	Riesgo de reacción alérgica. Puede causar problemas de oído y daños renales.	Inyectada.	