


Il existe des arguments en faveur et contre le fait de déjà commencer le traitement contre l'hépatite C ou de le remettre à plus tard.

Motifs pour retarder le traitement:

Le traitement contre l'hépatite C **ne fonctionne pas toujours**.



Dans les prochaines années, on disposera de **nouveaux et meilleurs médicaments**.



Les **effets secondaires**, tels que la sensation de fatigue, de malaise ou les changements d'humeur peuvent être graves, bien qu'ils puissent varier d'une personne à l'autre.




Il se peut que vous deviez retarder le traitement:

Si vous avez **d'autres priorités** du moment, tel que le travail ou des relations personnelles.



S'il vous serait difficile de prendre **toutes les doses** de médicament telles que vous devriez les prendre.



Si vous ou votre conjoint **attendez un enfant ou si la grossesse a lieu** pendant le traitement.




Si vous avez une **souche** du virus de l'hépatite C (génotype 1 ou 4) qui est plus difficile à traiter avec les médicaments actuels.




Motifs pour déjà commencer le traitement:

Le traitement peut **améliorer votre santé et éviter les dommages** au niveau du foie.



Si le traitement fonctionne, **il soignera votre hépatite C.**



Après un traitement qui a fonctionné, il n'y aura plus de risque de **transmission de l'hépatite C** à une autre personne.



Le traitement ne dure pas indéfiniment. En règle générale, il dure **6, 12 ou 18 mois.**



Il se peut que ce soit une bonne idée de déjà commencer le traitement:


Si vous vous êtes infecté il y a **moins de six mois**, étant donné que dans ce cas le traitement a plus de possibilité de succès.



Si votre foie est déjà **très endommagé** (besoin urgent de traitement).



Si vous avez une **souche** du virus de l'hépatite C (génotype 2 ou 3) plus facile à soigner.



A signaler:

- Décider du meilleur moment pour commencer le traitement contre l'hépatite C n'est pas simple.
- Il est important de recevoir un soutien et des conseils pour vous aider à prendre cette décision.

Notes:

Vous pouvez prendre des médicaments contre l'hépatite C et le VIH en même temps, mais il est préconisé de **ne pas commencer** les deux traitements à la fois.

Si votre foie est plus faible que votre système immunitaire, il vaut mieux commencer le traitement contre l'hépatite C avant et prendre la thérapie contre le VIH après.

Si votre système immunitaire est plus faible que votre foie, il vaut mieux commencer la thérapie contre le VIH avant et ajouter le traitement contre l'hépatite C plus tard.

Si votre état est stable avec un traitement contre le VIH, il vaut mieux le continuer et commencer le traitement contre l'hépatite C lorsque cela sera nécessaire.

Certains médicaments contre le VIH ne sont pas adaptés aux personnes qui prennent des médicaments contre l'hépatite C, mais il existe des alternatives disponibles.

Grossesse: Le médicament ribavirine peut endommager le fœtus. Si votre conjoint ou vous-même avez pris de la ribavirine les six derniers mois, vous devez utiliser des contraceptifs pour éviter une grossesse.