InfoVIHtal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH

128

FRANCÉS

Lorsque les personnes vivant avec le VIH sont sous traitement antirétroviral et ont une charge virale indétectable, leur possibilité de transmettre le VIH à d'autres est fortement improbable.

TRANSMISSION DU VIH ET CHARGE VIRALE

grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
POR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS
EQUIP DE TREBALL SOBRE INMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRASSANES

¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

¡POR FAVOR FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR!

01



Le **traitement antirétroviral** empêche le VIH de se reproduire et réduit la quantité de **virus dans le corps.**
La quantité de VIH est mesurée par analyse de sang nommée test de « charge virale ».

02

Lorsqu'une personne a une **charge virale indétectable**, cela signifie que le VIH n'est quasiment pas présent dans ses fluides corporels.

03



Lorsqu'il n'y a pratiquement aucune présence de VIH dans le sperme et les fluides vaginaux, il est **extrêmement peu probable que le VIH se transmette pendant le rapport sexuel**, même si on n'utilise pas de préservatifs.

04



Si vous ou votre partenaire avez le VIH, il se peut que vous souhaitiez **tenir compte de la charge virale au moment de prendre des décisions en ce qui concerne les rapports sexuels.**

05

Pas toutes les personnes sous traitement ont une charge virale indétectable, tout particulièrement si :

- Elles ont commencé le traitement il y peu de mois; ou
- Si elles sautent fréquemment leur prise de traitement ou si elles la prennent en retard

06



Avoir une charge virale indétectable **n'empêche pas la transmission d'autres infections sexuellement transmissibles.**
L'utilisation de préservatifs réduit ce risque.

07

À SOULIGNER



- Une charge virale indétectable indique que le traitement fonctionne bien et qu'il n'y a pratiquement pas de présence du VIH dans les fluides corporels.
- Dans cette situation, le risque de transmission du VIH est extrêmement faible.
- Si vous et votre partenaire souhaitez cesser d'utiliser des préservatifs, il est important de vous sentir tous deux à l'aise dans cette