

الزهري هو عدوٍ ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي (الامراض المتنقلة جنسياً) ناجة عن بكتيريا تربونيمبا باليدوم (Treponema pallidum). يرمز لها بـ ITS.

InfoVIHtal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH

149

ÁRABE

طبعة 2019

الزهري أو السفلس

الانتقال

يمكن أن تصاب بهذه العدوٍ أثناء علاقات جنسية دون إستعمال الغشاء الواقي مع شخص مصاب، من خلال ممارسة الجنس الشرجي أو المهبلي أو الفموي. يمكن للمرأة الحامل أن تنقل المرض إلى طفلها.



الأعراض

الأعراض هي نفسها لدى الرجال والنساء، فهي تختلف حسب مرحلة الإصابة ولا تظهر دائمًا. تظهر الأعراض الأولية عادةً بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. تمر العدوٍ بمرض الزهري عبر أربع مراحل مختلفة، وبالتالي، فإن فترة ظهور الأعراض سوف تتعلق بالمرحلة التي تتوارد فيها العدوٍ.



الزهري الثاني

يحدث عادةً بين ثلاثة وستة أسابيع من ظهور القرحة. أعراضه تتتمثل في: طفح جلدي (راحة البدين وباطن القمرين)، التهاب في منطقة الأعضاء التناسلية، بقع بيضاء على الفم وتورم في الغدد. على الرغم من عدم تلقى أي علاج، إلا أن الأعراض تختفي عادةً، لكن العدوٍ تستمر في النضام. في هذه المرحلة، ينتقل الزهري بدرجة كبيرة عن طريق الجنس.

الزهري الثالث

بعد سنوات عديدة من الإصابة، يصاب شخص واحد من كل 10 أشخاص مصابين بمرض الزهري الغير المعالج بمشاكل عصبية أو عظمية مفصلية أو قلبية خطيرة.

الزهري الأولي

ظهور قرحة غير مؤلمة (ما يسمى بـ شانكرو) في جهة الجسم التي كانت على اتصال بالبكتيريا (خاصة في القضيب، الفرج، المهبلي أو فتحة الشرج)، عموماً بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الإصابة. قد يستغرق الأمر إلى ستة أسابيع حتى تختفي، و حسب موضع الإصابة يمكن أن تمر العدوٍ دون أعراض.

مرض الزهري الكامن

بعد اختفاء أعراض مرض الزهري الثاني، قد لا تظهر أعراض لسنوات عديدة، حتى لو كانت العدوٍ لا تزال موجودة.

التشخيص

يتم تشخيص الزهري من خلال تحاليل الدم، في حالة وجود قرح، يمكن أخذ عينات. اختبارات الزهري السريعة التي تكشف عن وجود الأجسام المضادة ليست مفيدة لتشخيص الإصابة المتكررة.




العلاج

يتم علاج العدوٍ بمضادات حيوية. هذا العلاج لا يوفر حماية لمدى الحياة، لذلك يمكن الإصابة بالعدوٍ مرة أخرى.



الوقاية

الغشاء الواقي يقلل من خطر العدوٍ في الإتصال الجنسي المهبلي أو الشرجي أو عن طريق الفم. إذا تمت مشاركة اللعب الجنسية، فمن المهم استخدام غشاء واقي جديد لكل شخص وعند كل ممارسة جنسية. يوصى بتجنب الإتصال الجنسي حتى نهاية العلاج وإختفاء الأعراض.



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA		
GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, POLÍTICAS SOCIALES Y CONSUMO SECTERIÀ GENERAL DEL DEPARTAMENT DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA, POLÍTICAS SOCIALES I CONSUM
<input checked="" type="checkbox"/> POR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL		
Generalitat de Catalunya Agència de Salut Pública de Catalunya	Ajuntament de Barcelona ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Diputació de Barcelona ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
COLABORA		
ETIS ESTUDIOS INMIGRACIÓN Y SALUD		TROPICAL DRASSanes

TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGUNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org



¡POR FAVOR FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR!