


## DOENÇAS INTESTINAIS PARASITÁRIAS E VIH



### 01


#### OS PARASITAS E OS SEUS SINTOMAS

A infecção pelo VIH pode aumentar o risco de vir a sofrer de algumas doenças parasitárias. A maioria causam sintomas intestinais como diarreia.

Uma diarreia prolongada no tempo que não se consegue curar e que não responde ao tratamento pode estar a ser causada por parasitas intestinais. Para ter a certeza, há que fazer uma análise às fezes.

Alguns dos parasitas intestinais mais frequentes são:

- *Isospora belli*
- *Cryptosporidium*
- Giardia
- Entamoeba
- Blastocystis



### 02

#### TRANSMISSÃO E PREVENÇÃO

Os parasitas intestinais costumam apanhar-se ao consumir água ou alimentos contaminados com matéria fecal, ou no contacto sexual boca-ânus.

A prevenção baseia-se numa correcta higiene dos alimentos, no consumo de água potável e no uso de métodos barreira nas relações sexuais onde haja contacto boca-ânus.

### 03

#### A DESTACAR:

- Em geral, todas estas doenças apresentam tratamentos eficazes, ainda que as recaídas possam ser frequentes.
- Elas poderão ser mais frequentes, mais graves e difíceis de tratar em doentes com contagens baixas de células CD4.

**GTT-VIH**  
GRUPO DE TRABAJO SOBRE  
TRATAMIENTOS DEL VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

**SUBVENCIONA**

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
FOR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Generalitat de Catalunya / Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

**COLABORA**

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE INMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRASBÀNES



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org