


КИШЕЧНЫЕ ПАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВИЧ



01


ПАРАЗИТЫ И ИХ СИМПТОМЫ

Инфекция ВИЧ может увеличить риск заболеть некоторыми паразитарными заболеваниями. Большинство вызывают кишечные симптомы, такие как диарея.

Длительная диарея, которая не проходит и не отвечает на лечение, может быть вызвана кишечными паразитами. Чтобы узнать это, нужно будет сделать анализ кала.

Некоторые кишечные паразиты самые распространенные:

- Isospora belli
- Cryptosporidium
- Giardia
- Entamoeba
- Blastocystis



02

ПЕРЕДАЧА И ПРОФИЛАКТИКА

Кишечные паразиты обычно приобретаются через воду и зараженные продукты с каловой массой или через сексуальный контакт рот – анус.

Профилактика базируется на правильной гигиене продуктов питания, потребление питьевой воды и использование сексуальных методов защиты, если есть контакт рот - анус.

03

ВАЖНО:

- В целом, все эти болезни имеют эффективные методики лечения, хотя и повторное заражение их может быть частым.
- Могут быть частыми, более сильными или более трудными для лечения, если количество CD4 низкое.

GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FOR SOLIDARITAT / OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Generalitat de Catalunya / Agència de Salut Pública de Catalunya
Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS
Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT
TROPICAL DRABANES



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org