

PROFILAXIA POST-EXPUNERE



Este utilizarea medicamentelor pentru HIV, pentru a reduce riscul de a se contagia cu virusul, în urma unor practici de risc sau a unei expunerii accidentale (de exemplu, la locul de muncă).

01

Timpul este un factor foarte important. Pentru a obține beneficiul maxim, trebuie inițiat cât mai curând posibil, în mod ideal, în primele 4 ore de la practica de risc. Eficacitatea lui scade de formă progresivă și la 72 de ore nu este considerat eficient.



02

Pentru a solicita este necesar să mergeți la Serviciul de Urgențe al unui spital.

03

Serviciul de Urgențe al spitalelor trebuie să vă dea îngrijiri și să vă ofere un tratament, dacă este necesar, de formă gratuită chiar dacă nu dispuneți de cardul de sănătate.

04

Equipa de medici care vă tratează vor aprecia riscul de transmitere pentru a determina dacă în cazul dumneavoastră este nevoie de profilaxia post-expunere.

05

Tratamentul durează 28 de zile și este compus din trei medicamente care pot fi împărțite în două sau trei pastile diferite.

06

Profilaxia post-expunere, ca orice tratament cu medicamente, poate provoca unele efecte secundare, cum ar fi dureri de cap, stare generală de rău, înroșirea pielii sau diaree. Ele sunt de obicei ușoare și tranzitorii. Dacă vreuna dintre aceste reacții adverse este severă sau prelungită, consultați medicul care v-a prescris tratamentul, asupra formei de luare.



GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA



FOR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia



ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org