

ПРОФИЛАКТИКА ПОСТЭКСПОЗИЦИИ



Состоит из использования препаратов против ВИЧ для уменьшения риска возможности приобретения ВИЧ через практики риска или одну случайную экспозицию (например на работе).

01

Время - это важный фактор. Чтобы получить максимальную информацию, нужно начать как можно быстрее лечение, в идеале в первые часы после практики риска. Его эффективность уменьшается в прогрессирующей форме, и начиная с 72 часов не эффективна.



02

Чтобы получить лечение, нужно обратиться в Отделение Неотложной помощи в одной из больниц

03

Отделение Неотложной помощи медицинского центра должна принять вас и предложить вам лечение, если это требуется в бесплатной форме, даже если у вас нет медицинской карточки.

04

Медицинский персонал, который вас принимает оценит риск передачи и решит, нужна ли вам профилактика постэкспозиции.

05

Лечение имеет длительность 28 дней и состоит из трех препаратов, которые могут быть распределены на две или три разные таблетки.

06

Профилактика постэкспозиции, как и любое другое лечение с препаратами, может вызвать побочные эффекты, такие как головная боль, раздражение, покраснение кожи или диарея. Побочные эффекты могут быть легкими и проходящими. Если какой то из этих побочных эффектов интенсивен и длителен, обратитесь к тому врачу, который вам их прописал, и спросите, как разрешить эту ситуацию.



GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



FOR SOLIDARITAT
ALTRES FINES D'INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia

Ajuntament de Barcelona

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org