

TABACO Y VIH



Fumar es la principal causa evitable de enfermedad y fallecimiento a nivel mundial

01


El porcentaje de fumadores entre las personas con el VIH duplica el observado en la población general.

02

El tabaco resulta más dañino para las personas con el VIH que para aquellas no infectadas.

03

Las personas con el VIH corren un mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades:



04

Existen muchas estrategias para ayudarte a dejar de fumar. En muchos hospitales que atienden a personas con el VIH pueden ofrecerte ayuda.

05

Al dejar de fumar se notan rápidamente mejoras en la capacidad física y, con el tiempo, el riesgo de padecer enfermedades graves o fallecer también se reduce.



SE PUEDE PEDIR AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR



RÁPIDAMENTE SE NOTAN LAS MEJORAS FÍSICAS

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

GOBIERNO DE CATALUNYA / Agència de Salut Pública de Catalunya

GOBIERNO DE CATALUNYA / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE INMIGRACIÓ I SALUT

CRUZ ROJA / TROPICAL DRASMANES



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org