


AR TREBUI SĂ ÎNCEP TRATAMENTUL ANTIRETROVIRAL?



Dacă aveți HIV, începerea tratamentului, este un moment important. În această fișă vi se oferă informații care vă permit să aflați care sunt implicațiile începerii tratamentului pentru sănătatea dumneavoastră.

01 DE CE SE IA TRATAMENTUL?

Tratamentul reduce cantitatea de HIV aflată în organism (încărcătura virală). Acest lucru va ajuta să trăiască mai mult cu sănătate mai bună și mai bună calitate a vieții persoana infectată. De asemenea, în cazul în care încărcătura virală este nedetectabilă în mod constant, șansele de a transmite virusul altor persoane sunt practic nule.

Odată ce se începe tratamentul trebuie să se ia în fiecare zi și va trebui inclus în stilul său de viață. În general, cei mai mulți oameni consideră că le este ușor să ia medicamentele împotriva HIV.

Dacă nu luați încă tratament, începerea lui este o decizie importantă care ar trebui luată în considerare.

02 EFECTE SECUNDARE

Este posibil ca atunci când începeți să luați tratamentul să observați efecte, cum ar fi greață, stare de rău generalizată sau diaree. Este deoarece corpul său este "în stare de obișnuire" la medicamente. Efectele sunt de obicei ușoare și pot fi tratate, cu toate că ele dispar de la sine în decurs de câteva săptămâni. În cazul în care durează mai mult sau se înrăutățesc, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

Cu toate acestea, există și alte reacții adverse care pot să apară în timp. În afară de măsurarea încărcăturii virale și a nivelurilor de CD4, în monitorizarea medicală se controlează apariția acestor efecte astfel încât acestea să nu afecteze sănătatea și calitatea vieții.

03 CÂND TREBUIE ÎNCEPUT?

În actualitate se știe că, cu cât mai devreme se începe tratamentul va fi mai benefic pentru sănătate. Cu toate acestea, în cazul în care nu există o urgență medicală, este important să vă luați timpul necesar și să discutați cu medicul dumneavoastră despre toate aspectele care vă îngrijorează cu privire la tratament și îndoielile care apar înainte de a începe tratamentul.

04 OBSERVAȚII:

- Tratamentul va ajuta la îmbunătățirea sănătății imunitare și va reduce riscul de transmitere a HIV la partenerii sexuali.
- De aceea trebuie să-l luați întotdeauna după cum medicul dumneavoastră va recomanda.
- Este necesară testarea periodică pentru a verifica dacă tratamentul funcționează și posibilele efecte secundare.
- Dacă luați tratament HIV este cel mai bine să consultați medicul înainte de a lua alte medicamente, pentru a evita interacțiunile.
- Inițierea tratamentului este o decizie pe care trebuie să o luați când vă simțiți pregătit. Nimeni nu ar trebui să se simtă forțat sau intimidat pentru a începe luarea tratamentului.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA



FOR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia

Ajuntament de Barcelona

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



ETIS
EQUIP DE TREBALL SOBRE
INMIGRACIÓ I SALUT



TROPICAL
DRASSANES



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org