

## العلاج كوقاية من فيروس HIV

إذا كنت تأخذ أدوية ضد HIV ومزأكثر من ستة أشهر و حملتك  
الفيروسية غير قابلة للكشف ، فإنه من المستحيل تقريبا أن تنقل  
HIV عن طريق الجنس.

01  
لوحظ في إحدى الدراسات أن بعض الأشخاص الحاملين ل HIV وحمولة فيروسية  
غير قابلة للكشف قد توقفوا عن استعمال الغشاء الواقي الذكري مع شركائهم الغير  
الحاملين ل HIV. من خلال تحليل آلاف البيانات لهؤلاء الشركاء لم يتم الكشف عن  
أي حالة انتقال فيروس HIV.

02  
مع مرور 6 أشهر على حمولة فيروسية غير قابلة للكشف يمكنك التفكير في إنجاب  
أطفال عن طريق حمل طبيعي مع شريك حياتك. مع المتابعة الطبية الجيدة، فالنتيجة  
تكون آمنة ومضمونة لكلا الزوجين والطفل أيضا.



03  
على الرغم من أن العلاج يمنع انتقال HIV، لا ينبغي استخدام هذه الحجة لإجبار  
شخص حامل ل HIV على البدء الفوري في العلاج إذ لم يكن مستعدا ولا ينبغي  
إشعار الأشخاص المصابين ب HIV الذين ليس لديهم حمولة فيروسية غير قابلة  
للكشف بالتمييز.



gt grupo de  
trabajo sobre  
tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE  
UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



✓ POR SOLIDARIDAD  
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Ajuntament de Barcelona  
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,  
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació  
Barcelona  
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLLABORA



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org



¡POR FAVOR FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR!