

Si vous prenez des médicaments contre le VIH et que cela fait plus de 6 mois que votre charge virale est indétectable, il est pratiquement impossible que vous puissiez transmettre le VIH à travers des rapports sexuels.

01

Une étude a observé que certaines personnes ayant le VIH et une charge virale indétectable avaient abandonné l'utilisation du préservatif avec leurs partenaires n'ayant pas le VIH. L'analyse de ces données sur des milliers de couples n'a détecté aucun cas de transmission de VIH.

02

Même avec 6 mois de charge virale indétectable vous pouvez envisager d'avoir des enfants par conception naturelle avec votre conjoint. Avec un suivi médical adapté, il s'avère sûr aussi bien pour le conjoint que pour le bébé.



03

Ceci dit, malgré le fait que le traitement prévienne la transmission du VIH, cet argument ne doit jamais être utilisé pour obliger une personne ayant le VIH à commencer le traitement immédiatement s'il elle ne se sent pas préparée, ni pour discriminer les personnes ayant le VIH sans charge virale indétectable.

## TRAITEMENT EN TANT QUE PRÉVENTION DU VIH



**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
POR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL  
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Generalitat de Catalunya / Agència de Salut Pública de Catalunya  
Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS  
Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT  
TROPICAL DRASSANES



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org