


Se estiver a tomar medicação para o VIH e se estiver há mais de 6 meses com carga viral indetectável, é praticamente impossível que transmita o VIH a outra pessoa através do sexo.

TRATAMENTO COMO PREVENÇÃO DO VIH



01

Um estudo observou que algumas pessoas com VIH mas com carga viral indetectável tinham deixado de usar o preservativo com os seus parceiros (ou parceiras) sem VIH. Ao analisar os dados de milhares destes casais, não se detectou nenhum caso de transmissão do VIH.

02

Se estiver há mais de 6 meses com carga viral indetectável, também pode pôr a hipótese de ter filhos através de concepção natural com o seu/sua parceiro/a. Com um seguimento médico adequado, será perfeitamente seguro tanto para o casal como para o bebé.



03

Apesar do tratamento prevenir a transmissão do VIH, este argumento nunca deverá ser utilizado para obrigar uma pessoa com VIH, se ela não se sentir preparada, a iniciar o tratamento imediatamente, nem para discriminar as pessoas com VIH que não têm carga viral indetectável.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN A



POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia



ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLLABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org