


În cazul în care luați medicamente pentru HIV și încărcătura virală se menține nedetectabilă mai mult de 6 luni, este practic imposibil ca HIV să se poată transmite prin sex.

## TRATAMENTUL HIV CA PROFILAXIE



01

Datorită unui studiu s-a constatat că unele persoane cu HIV și cu încărcătura virală nedetectabilă au încetat să folosească prezervative cu partenerii lor, fără HIV. Prin analizarea datelor de la mii de astfel de cupluri nu a fost detectat nici un caz de transmitere a HIV.

02

Cu încărcătura virală nedetectabilă timp de 6 luni puteți, de asemenea, să vă planificați să aveți copii prin concepție naturală cu partenerul/a tău/ta. Cu o corectă monitorizare medicală, este sigur atât pentru cuplu cât și pentru copil.



03

Cu toate acestea, cu toate că tratamentul previne transmiterea virusului HIV, acest argument nu ar trebui să fie utilizat pentru a forța o persoană cu HIV pentru a începe tratamentul imediat, dacă nu se simte pregătit/ă, și nici să îi discrimineze pe cei cu HIV care nu au încărcătura virală nedetectabilă.

**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA



POR SOLIDARIDAD  
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya  
Agència de Salut Pública  
de Catalunya



Generalitat de Catalunya  
Departament  
de Justícia



Ajuntament de Barcelona  
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,  
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació  
Barcelona  
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org