

Если ты принимаешь препараты против ВИЧ, и на протяжении больше 6 месяцев анализы показывают, что вирусная нагрузка в крови не детектируема, шансы заразить другого человека практически равны нулю.

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ



01

В одном исследовании ученые отметили, что некоторые ВИЧ-инфицированные с не детектируемой нагрузкой перестали пользоваться презервативом со своими ВИЧ-негативными партнерами. Проанализировав информацию о тысячах подобных пар, выяснилось, что среди них не было ни одного случая заражения ВИЧ.

02

Если в течение 6 месяцев вирусная нагрузка не детектируема, можно рассмотреть возможность естественного зачатия детей с твоей второй половиной. При условии постоянного наблюдения у врача, это полностью безопасно как для будущих родителей, так и для малыша.



03

Несмотря на эти данные, а также на тот факт, что терапия позволяет избежать передачи ВИЧ партнеру, их ни в коем случае нельзя использовать как аргумент для принуждения ВИЧ-инфицированного незамедлительно начать лечение, если он к этому не готов, или как основание для дискриминации ВИЧ-положительных с детектируемой вирусной нагрузкой.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia

Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLLABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org