


TOMAR LOS FÁRMACOS A SU HORA



Para que el tratamiento frente al VIH funcione bien, hay que tomar siempre los medicamentos a la hora indicada, sin saltarse ninguna dosis.

Cada toma de medicamentos frente al VIH protege nuestro cuerpo durante varias horas.



A DESTACAR

- Es crucial tomar los medicamentos frente al VIH a las horas indicadas y en las cantidades adecuadas.
- Tomar el tratamiento antirretroviral con regularidad implica que siempre habrá suficiente cantidad de medicamento en el cuerpo, lo que mantendrá la infección controlada.
- Si no tomas la medicación como te han prescrito, puede ocurrir que el VIH sea más difícil de tratar en el futuro.

NOTAS

¿Qué puede pasar si no tomo los medicamentos a la hora indicada?

Si dejas de tomar más de una dosis al mes, aumentará el riesgo de que tu tratamiento deje de funcionar.

Puede que aumente la cantidad de VIH en el cuerpo, lo que debilitará tu sistema inmunitario.

Es posible que alguno de los nuevos virus sea 'resistente' a los fármacos frente al VIH. Es decir, que los medicamentos no funcionarán igual de bien.

Puede que necesites cambiar de tratamiento y que los nuevos fármacos no sean tan fáciles de tomar o conlleven más efectos secundarios.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA



POR SOLEDADIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia



Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org