


El virus del papiloma humano (VPH) se transmite principalmente por vía sexual. La vacunación antes del inicio de la vida sexual constituye la mejor herramienta de prevención del VPH. En España, la vacuna frente al VPH está incluida en el calendario de vacunación de niñas y jóvenes preadolescentes a los 12 años de edad y de las personas adultas con condiciones de vulnerabilidad frente a este virus.

## VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN PERSONA VULNERABLES



### 01

El VPH constituye un grupo de más de 100 tipos de virus relacionados entre sí. Estos virus viven en unas células que se encuentran en la superficie de la piel y en las superficies mucosas, como la vagina, el ano, el cuello uterino, la vulva; el interior del prepucio del pene y la uretra; el interior de la nariz, la boca y la garganta; la tráquea y los bronquios; y el interior de los párpados. Alrededor del 75% de los tipos de VPH causan verrugas comunes en la piel (a menudo en los brazos, el pecho, las manos y los pies). El 25% restante de los tipos de VPH afectan a las mucosas.

La transmisión del VPH se produce con mucha facilidad. La mayoría de las personas lo adquieren poco después del inicio de la actividad sexual. No obstante, no es necesario que haya sexo con penetración ni intercambio de fluidos para que se produzca la transmisión del VPH. Este virus puede transmitirse por contacto genital de piel con piel incluso cuando la persona infectada no presenta síntomas. Además, el virus puede encontrarse en zonas del área genital y anal que los preservativos no podrían proteger. Por lo tanto, los preservativos reducen el riesgo de adquirir el VPH, pero no lo eliminan por completo.

El VPH no causa síntomas y lo más habitual es que la infección se resuelva por sí sola en la gran mayoría de los casos en menos de dos años. Muchas personas no llegan a saber nunca que han tenido una infección por el VPH. Si la infección persiste, algunos tipos de bajo riesgo pueden causar verrugas genitales que son muy frecuentes e infecciosas. Otros tipos de VPH de alto riesgo pueden causar lesiones precancerosas o cáncer. El VPH es la causa de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino, así como muchos cánceres de vagina, vulva, ano, pene y orofaringe (cáncer de garganta y boca).

### 02

## VACUNACIÓN FRENTE AL VPH

La mejor herramienta de prevención del VPH es la vacunación antes del inicio de la vida sexual. Las vacunas frente al VPH no contienen el virus completo ni material genético del virus, de forma que no pueden producir la enfermedad. Las vacunas disponibles son seguras y efectivas y actúan estimulando la producción de defensas (anticuerpos) frente al VPH.

Las vacunas previenen las lesiones precancerosas y cánceres que afectan al cuello de útero, vulva, vagina y ano, y las verrugas genitales. Todas estas condiciones están causadas por tipos específicos del VPH para los que la vacuna ofrece protección.

**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENCIA 2030  
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD  
SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA  
SECRETARÍA DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL VIH

POR SOLIDARIDAD  
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya  
Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya Salut/ Agència de Salut Pública de Catalunya

Ajuntament de Barcelona  
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona  
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT  
Vall d'Hebron eSPiC Equip de salut pública i comunitària



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org

En España, la vacuna frente al VPH está incluida en el calendario de vacunación para las niñas a los 12 años de edad y es gratuita. La pauta de vacunación es de 2 dosis administradas con una separación de, al menos, 5-6 meses (según la vacuna utilizada). A las jóvenes entre 13 y 18 años que no han sido vacunadas previamente, o que han sido vacunadas de forma parcial, se les administran 3 dosis con una pauta de 0, 1-2, 6 meses (según la vacuna utilizada).

En población infantil y adolescente, la vacuna está autorizada en España, pero no está incluida en el calendario de vacunación y, por lo tanto, no es gratuita.

### 03 ACCESO A LA VACUNA FRENTE AL VPH EN PERSONAS VULNERABLES

Además, en España, se recomienda desde 2018 la vacunación gratuita frente al VPH a personas adultas que presentan determinadas condiciones de susceptibilidad al VPH. La pauta de vacunación recomendada es de 3 dosis administradas a los 0, 2 y 6 meses. Se consideran personas con condiciones de vulnerabilidad a:

- Personas con síndrome WHIM (inmunodeficiencia primaria; vacuna que cubra tipos 6 y 11 del VPH)
- Personas con el VIH (hasta los 26 años)
- Hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres -GBHSH- (hasta los 26 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 26 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Mujeres que han recibido un trasplante de órgano sólido (TOS) o un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) (hasta los 26 años)

En el siguiente listado se recogen las recomendaciones que las comunidades autónomas han adoptado para vacunar a las personas con condiciones de vulnerabilidad al VPH.

#### ANDALUCÍA

- Personas con síndrome WHIM (sin límite de edad)
- Personas con infección por el VIH (hasta los 26 años)
- Hombres GBHSH (hasta los 26 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 26 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Mujeres con TOS o TPH o enfermedades que requieran inmunosupresores (hasta los 26 años)

#### ARAGÓN

- Personas con el VIH (hasta los 26 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Mujeres con TOS o TPH (hasta los 26 años)
- Hombres GBHSH (hasta los 26 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 26 años)

#### ASTURIAS

- Personas con síndrome WHIM u otras inmunodeficiencias primarias (sin límite de edad)
- Personas con el VIH (hasta los 26 años)
- Hombres GBHSH (sin límite de edad)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (sin límite de edad)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Mujeres con TOS o TPH o enfermedades que requieran tratamiento inmunosupresor (hasta los 26 años)

#### BALEARES

- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)

#### CANARIAS

- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (de 25 a 45 años)
- Mujeres con Enfermedad Inflamatoria Intestinal
- Hombres GBHSH



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org

### CANTABRIA

- Personas con síndrome WHIM (sin límite de edad)
- Personas con el VIH (hasta los 26 años)
- Hombres GBHSH (hasta los 26 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 26 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Mujeres con TOS o TPH (hasta los 26 años)

### CASTILLA Y LEÓN

- Personas con síndrome WHIM (sin límite de edad)
- Personas con el VIH (hasta los 26 años)
- Hombres GBHSH (hasta los 26 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 26 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Mujeres con TOS o TPH (hasta los 26 años)

### CASTILLA-LA MANCHA

- Personas con síndrome WHIM (sin límite de edad)
- Personas con el VIH (hasta los 26 años)
- Hombres GBHSH (hasta los 26 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 26 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)

### CATALUÑA

- Personas con el VIH (hasta los 26 años)
- Personas con síndrome de insuficiencia medular congénita (sin límite de edad)
- Mujeres con TOS o TPH (hasta los 26 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Hombres GBHSH (hasta los 26 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 26 años)
- Personas que han sufrido abuso sexual (hasta los 26 años)

### COMUNIDAD DE MADRID

- Personas con síndrome WHIM (sin límite de edad)
- Personas con el VIH (hasta los 26 años)
- Hombres GBHSH (hasta los 26 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 26 años)
- Mujeres que hayan tenido cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Mujeres con TOS o TPH (hasta los 45 años)

### COMUNIDAD VALENCIANA

- Personas con el VIH (sin límite de edad)
- Hombres GBHSH (hasta los 26 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)

### EXTREMADURA

Extremadura no financia actualmente a ningún grupo de personas con condiciones de vulnerabilidad. La financiación para estos grupos será a partir de enero de 2022.

### GALICIA

- Personas con síndrome WHIM (sin límite de edad)
- Personas con el VIH (hasta los 45 años)
- Hombres GBHSH (hasta los 45 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 45 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Mujeres con TOS o TPH (hasta los 45 años)

### LA RIOJA

- Personas con síndrome WHIM (sin límite de edad)
- Personas con el VIH (hasta los 26 años)
- Hombres GBHSH (hasta los 26 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 26 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Mujeres con TOS o TPH (hasta los 26 años)



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org

### NAVARRA

- Personas con síndrome WHIM u otras inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (sin límite de edad)
- Personas con infección por el VIH (sin límite de edad)
- Hombres GBHSH (hasta los 26 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 26 años)
- Mujeres que hayan tenido cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Mujeres con TOS o TPH o enfermedades que requieran inmunosupresores (sin límite de edad)

### PAÍS VASCO

- Personas con síndrome WHIM u otras inmunodeficiencias (sin límite de edad)
- Personas con infección por el VIH (hasta los 45 años)
- Hombres GBHSH (hasta los 45 años)
- Personas que ejercen el trabajo sexual (hasta los 45 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (sin límite de edad)
- Mujeres con TOS o TPH o enfermedades que requieran inmunosupresores (hasta los 45 años)
- Mujeres en tratamiento con el inmunosupresor azatioprina (hasta los 45 años)

### REGIÓN DE MURCIA

- Hombres GBHSH (hasta los 26 años)
- Personas con el VIH (en función del riesgo de exposición y con serología al VPH previa negativa)
- Mujeres con lesión intraepitelial de cérvix de alto grado (sin límite de edad)

### CEUTA


No hay información disponible sobre si la ciudad autónoma financia la vacuna frente al VPH en personas con condiciones de vulnerabilidad.

### MELILLA

- Mujeres con inmunodeficiencia primaria (hasta los 45 años)
- Mujeres que se hayan sometido a cirugía de cérvix (hasta los 45 años)
- Mujeres con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (hasta los 65 años)

**Fuente:** Grupo de trabajo vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, julio 2018.

**Nota:** El contenido de esta ficha se elaboró en septiembre de 2021 por lo que las recomendaciones podrían no estar actualizadas. La información no pretende sustituir la recibida por un profesional sanitario. Las decisiones sobre la salud siempre deberían tomarse tras consultar con los profesionales sanitarios.



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org