


L'infection à papillomavirus (HPV) se transmet principalement par contact sexuel. La vaccination avant le début de la vie sexuelle constitue le meilleur outil de prévention contre les HPV. En Espagne, le vaccin contre les HPV est inclus dans le calendrier de vaccination des filles âgées de 12 ans et chez les adultes qui présentent des conditions de vulnérabilité face à ce virus.

VACCINATION CONTRE LES INFECTIONS À PAPILLOMAVIRUS CHEZ LES PERSONNES VULNÉRABLES



01

Les HPV constituent un groupe de plus de 100 types de virus liés entre eux. Ces virus pénètrent dans des cellules localisées sur la superficie de la peau et les superficies muqueuses telles que le vagin, l'anus, le col de l'utérus, la vulve ; l'intérieur du prépuce et de l'urètre du pénis ; l'intérieur du nez, de la bouche et de la gorge ; la trachée et les bronches ; et l'intérieur des paupières. Autour de 75 % des types de HPV provoquent des verrues communes sur la peau (généralement sur les bras, la poitrine, les mains et les pieds). Les 25 % restants touchent les muqueuses.

La transmission des HPV se produit avec une grande facilité. Dans la majorité des cas, l'infection a lieu au début de la vie sexuelle. Cependant, la transmission des HPV peut se produire sans même qu'il y ait de pénétration sexuelle ou d'échange de fluides. Ce virus peut se transmettre par contact génital de peau à peau même si la personne infectée ne présente aucun symptôme. De plus, le virus peut se trouver dans des zones des parties génitales et anales que les préservatifs ne pourraient pas protéger. Ainsi, les préservatifs réduisent le risque d'infection aux HPV, mais ils ne l'éliminent pas complètement.

Les HPV ne provoquent pas de symptômes et dans la plupart des cas l'infection s'élimine par elle-même en moins de deux ans. Beaucoup de personnes ont été infectés par les HPV sans jamais le savoir. Si l'infection persiste, certains types à bas risque peuvent causer des verrues génitales qui sont très fréquentes et infectieuses. D'autres types de HPV à haut risque peuvent provoquer des lésions précancéreuses ou des cancers. Les HPV sont à l'origine de la majorité des cas de cancer du col de l'utérus, ainsi que de nombreux cancers du vagin, de la vulve, de l'anus, du pénis et de l'oropharynx (cancer de la gorge et de la bouche).

02

VACCINATION CONTRE LES HPV

Le meilleur outil de prévention des HPV est la vaccination avant le début de la vie sexuelle. Les vaccins contre les HPV ne contiennent pas le virus complet ni le matériel génétique du virus, et ne peuvent donc pas produire la maladie. Les vaccins disponibles sont sûrs, effectifs et agissent en stimulant la production de défenses (anticorps) contre les HPV.

Les vaccins évitent les lésions précancéreuses et les cancers qui affectent le col de l'utérus, la vulve, le vagin, l'anus et les verrues génitales. Toutes ces conditions sont provoquées par des types spécifiques de HPV contre lesquels le vaccin offre une protection.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENCIA 2030
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD
SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
COMISIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SECRETARÍA DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA

POR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya Salut / Agència de Salut Pública de Catalunya

Ajuntament de Barcelona ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS EQUIP DE TREBALL SOBRE INMIGRACIÓ I SALUT

Vall d'Hebron eSPiC Equip de salut pública i comunitària



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

En Espagne, le vaccin contre les HPV est gratuit et inclus dans le calendrier de vaccination des filles à l'âge de 12 ans. Le schéma de vaccination est de 2 doses administrées avec une séparation d'au moins 5-6 mois (en fonction du vaccin utilisé). Pour les jeunes entre 13 et 18 ans qui n'ont pas été vaccinés avant, ou qui n'ont été que partiellement vaccinés, il leur sera administré 3 doses selon un schéma vaccinal de 0, 1-2, 6 mois (en fonction du vaccin utilisé).

Pour les garçons et les adolescents, le vaccin est autorisé en Espagne, mais il n'est pas inclus dans le calendrier de vaccination et, par conséquent, il n'est pas gratuit.

03

ACCÈS AU VACCIN CONTRE LES HPV CHEZ LES PERSONNES VULNÉRABLES

De plus, en Espagne, on recommande depuis 2018 la vaccination gratuite contre les HPV des adultes qui présentent des conditions déterminées de susceptibilité aux HPV. Le schéma de vaccination recommandé est de 3 doses administrées aux 0, 2 et 6 mois. Les personnes considérées comme présentant des conditions de vulnérabilité sont les suivantes :

- Les personnes souffrant du syndrome WHIM (immunodéficience primaire ; vaccin qui couvre les HPV de type 6 et 11)
- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 26 ans)
- Les hommes gais, bisexuels ou ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes -GBHSH- (jusqu'à 26 ans).
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes ayant reçu une transplantation d'organe solide (TOS) ou une transplantation de progéniteurs hématopoïétiques (TPH) (jusqu'à 26 ans)

La liste ci-dessous regroupe les recommandations que les communautés autonomes ont adoptées pour vacciner les personnes vulnérables face aux HPV.

ANDALOUSIE

- Les personnes atteintes du syndrome WHIM (sans limite d'âge)
- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 26 ans)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes souffrant de TOS ou de TPH ou de maladies qui requièrent des immunosuppresseurs (jusqu'à 26 ans)

ARAGON

- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes souffrant de TOS ou de TPH (jusqu'à 26 ans)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 26 ans)

ASTURIES

- Les personnes atteintes du syndrome WHIM ou d'autres immunodéficience primaires (sans limite d'âge)
- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 26 ans)
- Les hommes GBHSH (sans limite d'âge)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes souffrant de TOS ou de TPH ou de maladies qui requièrent des immunosuppresseurs (jusqu'à 26 ans)

BALÉARES

- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)

CANARIES

- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (entre 25 et 45 ans)
- Les femmes atteintes de la maladie inflammatoire de l'intestin (MII)



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

CANTABRIE

- Les personnes atteintes du syndrome WHIM (sans limite d'âge)
- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 26 ans)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes souffrant de TOS ou de TPH (jusqu'à 26 ans)

CASTILLE-ET-LEÓN

- Les personnes atteintes du syndrome WHIM (sans limite d'âge)
- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 26 ans)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes souffrant de TOS ou de TPH (jusqu'à 26 ans)

CASTILLE-LA MANCHE

- Les personnes atteintes du syndrome WHIM (sans limite d'âge)
- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 26 ans)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)

CATALOGNE

- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes atteintes du syndrome d'insuffisance médullaire congénitale (sans limite d'âge)
- Les femmes souffrant de TOS ou de TPH (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes victimes d'abus sexuels (jusqu'à 26 ans)

COMMUNAUTÉ DE MADRID

- Les personnes atteintes du syndrome WHIM (sans limite d'âge)
- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 26 ans)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes souffrant de TOS ou de TPH (jusqu'à 45 ans)

COMMUNAUTÉ VALENCIENNE

- Les personnes vivant avec le VIH (sans limite d'âge)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)

ESTRÉMADURE

- L'Estrémadure ne finance actuellement aucun groupe de personnes présentant des conditions de vulnérabilité. Le financement pour ces groupes débutera à partir de janvier 2022.

GALICE

- Les personnes atteintes du syndrome WHIM (sans limite d'âge)
- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 45 ans)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 45 ans)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 45 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes souffrant de TOS ou de TPH (jusqu'à 45 ans)

LA RIOJA

- Les personnes atteintes du syndrome WHIM (sans limite d'âge)
- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 26 ans)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes souffrant de TOS ou de TPH (jusqu'à 26 ans)



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

NAVARRRE

- Les personnes atteintes du syndrome WHIM ou d'autres immunodéficiences congénitales ou acquises (sans limite d'âge)
- Les personnes vivant avec le VIH (sans limite d'âge)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 26 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes souffrant de TOS ou de TPH ou de maladies qui requièrent des immunosuppresseurs (sans limite d'âge)

PAYS BASQUE

- Les personnes atteintes du syndrome WHIM ou d'autres immunodéficiences (sans limite d'âge)
- Les personnes vivant avec le VIH (jusqu'à 45 ans)
- Les hommes GBHSH (jusqu'à 45 ans)
- Les personnes exerçant le travail sexuel (jusqu'à 45 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes souffrant de TOS ou de TPH ou de maladies qui requièrent des immunosuppresseurs (jusqu'à 45 ans)
- Les femmes recevant un traitement immunosuppresseur par azathioprine (jusqu'à 45 ans)

RÉGION DE MURCIE

- Les hommes GBHSH (jusqu'à 26 ans)
- Les personnes vivant avec le VIH (en fonction du risque d'exposition et avec une sérologie aux HPV préalable négative)
- Les femmes souffrant de lésions intra-épithéliales de cervix de haut grade (sans limite d'âge)

CEUTA

Nous ne disposons d'aucune information relative au financement par la ville autonome du vaccin contre les HPV pour les personnes présentant des conditions de vulnérabilité.

MELILLA

- Les femmes souffrant d'immunodéficiences primaires (jusqu'à 45 ans)
- Les femmes ayant subi une chirurgie du cervix (sans limite d'âge)
- Les femmes atteintes de la maladie inflammatoire de l'intestin (MII) (jusqu'à 65 ans)

Source : Groupe de travail sur la vaccination de la population adulte et des groupes à risque du Programme et du Registre des Vaccinations. Vaccination dans les groupes à risque de tous âges et dans des situations spécifiques. Commission de Santé publique du Conseil interterritorial du Système national de Santé Espagnol. Ministère de la Santé, de la Consommation et de la Protection sociale Espagnol, juillet 2018.

Note : étant donné que le contenu de cette fiche a été élaboré en septembre 2021, les recommandations pourraient ne pas être actualisées. Les informations ne prétendent pas remplacer celles reçues par un professionnel de santé. Les décisions concernant la santé devraient être prises après avoir consulté les professionnels de santé.



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org