


## VACCINAREA CU VIRUSUL PAPILOMEI UMANE LA PERSOANELE VULNERABILE



Virusul papilomei umane (HPV) se transmite în principal pe cale sexuală. Vaccinarea înainte de începerea vieții sexuale este cel mai bun instrument de prevenire a HPV. În Spania, vaccinul HPV este inclus în calendarul de vaccinare pentru fetele preadolescente și tineri la vârsta de 12 ani și pentru adulții cu afecțiuni vulnerabile în fața acestui virus.

### 01

HPV cuprinde un grup de peste 100 de tipuri de virusuri legate între ele. Acești virusi trăiesc în celule care se găsesc pe suprafața pielii și pe suprafețe mucoase, cum ar fi vaginul, anusul, colul uterin, vulva; interiorul preputului și uretra penisului; interiorul nasului, a gurii și a gâtului; la traheea și bronhiile; și interiorul pleoapelor. Aproximativ 75% dintre tipurile de HPV provoacă veruci obișnuite pe piele (deseori pe brațe, piept, mâini și picioare). Restul de 25% dintre tipurile de HPV afectează mucoasele corpului.

Transmiterea HPV are loc cu multă ușurință. Majoritatea persoanelor îl dobândesc la scurt timp după ce încep activitatea sexuală. Cu toate acestea, sexul cu penetrare sau schimbul de fluide nu este necesar pentru ca transmiterea HPV să aibă loc. Acest virus poate fi transmis prin contactul genital piele pe piele chiar și atunci când persoana infectată nu prezintă simptome. De asemenea, virusul poate fi găsit în prejurul zonei genitale și anale pe care prezervativele nu le pot proteja. Prin urmare, prezervativele reduc riscul de a dobândi HPV, dar nu îl elimină complet.

HPV nu provoacă simptome și cel mai frecvent este că infecția se rezolvă de la sine în marea majoritate a cazurilor în mai puțin de doi ani. Se poate ca mulți oameni să nu știe niciodată că au avut o infecție cu HPV. Dacă infecția persistă, unele tipuri cu risc scăzut pot provoca veruci genitale care sunt foarte frecvente și infecțioase. Alte tipuri de HPV cu risc ridicat pot provoca leziuni precanceroase sau cancer. HPV este cauza majorității cazurilor de cancer de col uterin, precum și a multor cancere de vagin, vulve, anus, penis și orofaringe (cancer de gât și gură).

### 02

## VACCINAREA ÎMPOTRIVA HPV

Cel mai bun instrument de prevenire a HPV este vaccinarea înainte de începerea vieții sexuale. Vaccinurile HPV nu conțin virusul complet sau materialul genetic al virusului, așa că nu pot provoca boala. Vaccinurile disponibile sunt sigure și eficiente și funcționează prin stimularea producției de apărare (anticorpi) împotriva HPV.

Vaccinurile previn leziunile precanceroase și cancerele care afectează colul uterin, vulva, vaginul și anusul, precum și verucile genitale. Toate aceste afecțiuni sunt cauzate de anumite tipuri de HPV pentru care vaccinul oferă protecție.

**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENCIA 2030  
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD  
SECRETARÍA DE ESTADO EF SANIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

POR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya Salut/ Agència de Salut Pública de Catalunya

Ajuntament de Barcelona ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació de Barcelona ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COL·LABORA

ETIS Equip de Treball sobre INMIGRACIÓ I SALUT

Vall d'Hebron eSPiC Equip de salut pública i comunitària



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org

În Spania, vaccinul HPV este inclus în programul de vaccinare pentru fetele la vârsta de 12 ani și este gratuit. Modul de vaccinare este de 2 doze administrate la cel puțin 5-6 luni distanță între ele (în funcție de vaccinul utilizat). În cazul fetelor tinere între 13 și 18 ani care nu au fost vaccinate anterior, sau care au fost doar parțial vaccinate, li se administrează 3 doze cu modul de 0, 1-2, 6 luni (în funcție de vaccinul utilizat).

La copiii și adolescenții, vaccinul este autorizat în Spania, dar nu este inclus în calendarul de vaccinare și, prin urmare, nu este gratuit.

### 03 ACCESUL LA VACCINUL HPV LA PERSOANELE VULNERABILE

În plus, în Spania, vaccinarea gratuită împotriva HPV este recomandată din 2018 pentru adulții cu anumite condiții de susceptibilitate la HPV. Schema de vaccinare recomandată este de 3 doze administrate la 0, 2 și 6 luni. Persoanele considerate în condiții de vulnerabilitate sunt:

- Persoane cu sindromul WHIM (imunodeficiență primară; vaccin care acoperă tipurile HPV 6 și 11)
- Persoane cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
- Bărbații gay, bisexuali și alți bărbați care întrețin sex cu bărbați -GBHSH- (până la vârsta de 26 de ani). Persoane care practică munca sexuală (până la vârsta de 26 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Femei care au primit un transplant de organe solide (TOS) sau un transplant de celule stem hemopoietice (TPH) (până la vârsta de 26 de ani)

Următoarea listă conține recomandările pe care comunitățile autonome le-au adoptat pentru vaccinarea persoanelor în condiții de vulnerabilitate la HPV.

#### ANDALUSIA

- Persoane cu sindromul WHIM (fără limită de vârstă)
- Persoane cu infecție HIV (până la vârsta de 26 de ani)
- Bărbați GBHSH (până la 26 de ani)
- Persoane care practică munca sexuală (până la 26 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Femei cu TOS sau TPH sau boli care necesită imunosupresoare (până la 26 de ani)

#### ARAGON

- Persoane cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Femei cu TOS sau TPH (până la vârsta de 26 de ani)
- Bărbați GBHSH (până la 26 de ani)
- Persoane care practică munca sexuală (până la 26 de ani)

#### ASTURIAS

- Persoane cu sindromul WHIM sau alte imunodeficiențe primare (fără limită de vârstă)
- Persoane cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
- Bărbați GBHSH (fără limită de vârstă)
- Persoane care practică munca sexuală (fără limită de vârstă)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Femei cu TOS sau TPH sau boli care necesită tratament imunosupresor (până la 26 de ani)

#### BALEARES

- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)

#### CANARIAS

- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (cu vârsta cuprinsă între 25 și 45 de ani)
- Femei cu Boală Inflamatorie Intestinală
- Bărbați GBHSH



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org

### CANTABRIA

- Persoane cu sindromul WHIM (fără limită de vârstă)
- Persoane cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
- Bărbați GBHSH (până la 26 de ani)
- Persoane care practică munca sexuală (până la 26 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Femei cu TOS sau TPH (până la 26 de ani)

### CASTILLA ȘI LEON

- Persoane cu sindromul WHIM (fără limită de vârstă)
- Persoane cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
- Bărbați GBHSH (până la 26 de ani)
- Persoane care practică munca sexuală (până la 26 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Femei cu TOS sau TPH (până la vârsta de 26 de ani)

### CASTILLA - LA MANCHA

- Persoane cu sindromul WHIM (fără limită de vârstă)
- Persoane cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
- Bărbați GBHSH (până la 26 de ani)
- Persoane care practică munca sexuală (până la 26 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)

### CATALONIA

- Persoane cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
- Persoane cu sindromul de insuficiență congenitală a măduvei spinării (fără limită de vârstă)
- Femei cu TOS sau TPH (până la vârsta de 26 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Bărbați GBHSH (până la 26 de ani)
- Persoane care practică munca sexuală (până la 26 de ani)
- Persoane care au suferit abuz sexual (până la vârsta de 26 de ani)

### COMUNITATEA DE MADRID

- Persoane cu sindromul WHIM (fără limită de vârstă)
- Persoane cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
- Bărbați GBHSH (până la 26 de ani)
- Persoane care practică munca sexuală (până la 26 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Femei cu TOS sau TPH (până la 45 de ani)

### COMUNITATEA VALENȚIANA

- Persoane cu HIV (fără limită de vârstă)
- Bărbați GBHSH (până la 26 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)

### EXTREMADURA

Extremadura nu finanțează în prezent niciun grup de persoane în condiții vulnerabile. Finanțarea acestor grupuri va începe în ianuarie 2022.

### GALIȚIA

- Persoane cu sindromul WHIM (fără limită de vârstă)
- Persoane cu HIV (până la 45 de ani)
- Bărbați GBHSH (până la 45 de ani)
- Persoane care practică munca sexuală (până la 45 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Femei cu TOS sau TPH (până la 45 de ani)

### LA RIOJA

- Persoane cu sindromul WHIM (fără limită de vârstă)
- Persoane cu HIV (până la 26 de ani)
- Bărbați GBHSH (până la 26 de ani)
- Persoane care practică munca sexuală (până la 26 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Femei cu TOS sau TPH (până la 26 de ani)



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org

### NAVARRA

- Persoane cu sindromul WHIM sau alte imunodeficiențe congenitale sau dobândite (fără limită de vârstă)
- Persoane cu infecție HIV (fără limită de vârstă)
- Bărbați GBHSH (până la 26 de ani)
- Persoane care practică munca sexuală (până la 26 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Femei cu TOS sau TPH sau boli care necesită imunosupresoare (fără limită de vârstă)

### ȚARA VASCĂ

- Persoane cu sindromul WHIM sau alte imunodeficiențe (fără limită de vârstă)
- Persoane cu infecție HIV (până la 45 de ani)
- Bărbați GBHSH (până la 45 de ani)
- Persoane care practică munca sexuală (până la 45 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (fără limită de vârstă)
- Femei cu TOS sau TPH sau boli care necesită imunosupresoare (până la 45 de ani)
- Femei care sunt tratate cu imunosupresorul azatioprină (cu vârsta de până la 45 de ani)

### REGIUNEA DE MURCIA

- Bărbați GBHSH (până la 26 de ani)
- Persoane cu HIV (în funcție de riscul de expunere și cu serologie HPV negativă anterioară)
- Femei cu leziune intraepitelială a colului uterin de grad înalt (fără limită de vârstă)

### CEUTA

Nu există informații disponibile asupra faptului dacă orașul autonom finanțează vaccinul HPV la persoanele în condiții vulnerabile.

### MELILLA

- Femei cu imunodeficiență primară (până la 45 de ani)
- Femei care au suferit o intervenție chirurgicală la colul uterin (până la 45 de ani)
- Femei cu Boală Inflamatorie Intestinală (până la 65 de ani)

**Sursa:** Grupul de lucru Vaccinări în populația adultă și grupurile de risc din Registrul de Vaccinări și Raportul Programului. Vaccinarea în grupurile de risc de toate vârstele și în anumite situații. Comisia de Sănătate Publică a Consiliului Interteritorial al Sistemului Național de Sănătate. Ministerul Sănătății, Consumului și Asistenței Sociale, iulie 2018.

**Notă:** Conținutul acestei fișe a fost pregătit în septembrie 2021, deci este posibil ca recomandările să nu fie actualizate. Informațiile nu sunt destinate să le înlocuiască pe cele primite de un profesionist din domeniul sănătății. Deciziile privind sănătatea trebuie luate întotdeauna în consultare cu profesioniștii din domeniul sănătății.



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org