


RECOMENDAÇÕES DE VACINAÇÃO PARA PESSOAS COM O VIH



As pessoas com o VIH podem apresentar uma maior suscetibilidade face a determinadas infeções, sobretudo se o seu sistema imunológico estiver mais debilitado. Por este motivo, é-lhes recomendado vacinarem-se com a maioria de vacinas incluídas no calendário de vacinação. Existem determinadas recomendações e advertências dirigidas especificamente às pessoas com o VIH em relação a algumas vacinas. Esta ficha contém informação e orientações que podem ser-te úteis para falar sobre este tema com a equipa médica que te atender.

Vacina	Doses	Comentários
Neumococo • PCV13: vacina conjugada pneumocócica contra 13 tipos de bactérias • PPSV23: vacina pneumocócica não conjugada contra 23 tipos de bactérias	2 doses em 8 semanas	Adultos não vacinados: 1 dose de PCV13 e depois outra (pelo menos 8 semanas mais tarde) de PPSV23 Adultos vacinados com PPSV23: • 1 dose de PCV13 pelo menos 1 ano depois da última dose de PPSV23; ou • 1 dose de PPSV23 cada ano durante 5 anos
Gripe	1 dose anual	• É recomendável administrá-la todos os anos • Deve-se usar a vacina inativada não replicativa
Hepatitis B (VHB)	3 ou 4 doses em 6 meses	• É recomendável administrar três injeções com doses altas (0, 1 e 6 meses) ou, • Administrar quatro injeções com doses baixas (0, 1, 2 e 6 meses) • Comprovar os níveis de anticorpos e, em caso de serem insuficientes, administrar três novas injeções mensais de doses altas ou nova vacinação com a mesma pauta
Hepatitis A (VHA)	2 ou 3 doses num período de 6 meses	• É recomendável uma pauta de duas doses (0, 6 meses) em pessoas com contagem de CD4 acima de 350 células/mm ³ • É recomendável uma pauta de três doses (0, 1 e 6 meses) em pessoas com contagem de CD4 abaixo de 350 células/mm ³

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
 ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
 ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENCIA IDA
 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA SECRETARÍA DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA

POR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya Salut/ Agència de Salut Pública de Catalunya

Ajuntament de Barcelona ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació de Barcelona ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

Vall d'Hebron eSPiC Equip de salut pública i comunitària



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
 consultas@gtt-vih.org

Vacina	Doses	Comentários
<p>Vírus do papiloma humano (VPH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vacina bivalente do VPH: Proteção contra 2 tipos de VPH • Vacina quadrivalente: Proteção contra 4 tipos de VPH • Vacina contra 9 tipos de VPH Proteção contra 9 tipos de VPH 	3 doses num período de 6 meses (0, 1-2 e 6)	<ul style="list-style-type: none"> • A vacina recomenda-se a pessoas com o VIH até aos 26 anos ou 45 anos dependendo da comunidade autónoma. • Recomenda-se a vacina contra 9 tipos de VPH • Ler a ficha nº 147
<p>Meningococo</p> <ul style="list-style-type: none"> • MenC: Vacina meningocócica conjugada contra o serogrupo C • MenACWY: Vacina meningocócica conjugada contra os serogrupos A, C, W e Y (MenACWY) 	2 doses (0, 2 meses)	<ul style="list-style-type: none"> • Recomenda-se a vacina MenACWY • Valorar-se-á a administração de uma dose de reforço passados 5 anos
<p>Tétanos</p>	5 doses. Valorar-se-ão doses adicionais cada 10 anos	<ul style="list-style-type: none"> • Se a pessoa estiver corretamente vacinada (5 doses), valorar-se-ão doses de reforço cada 10 anos em caso de risco de exposição
<p>SARS-CoV-2 (COVID-19)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vacina de ARNm (Comirnaty®; Pfizer) • Vacina de ARNm (Spikevax®; Moderna) 	2 doses (0-21 dias ou 0-28 dias) ou 1 dose. Valorar-se-á a administração de uma dose adicional em determinadas circunstâncias	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendam-se as vacinas de ARNm às pessoas com o VIH com um sistema imunológico debilitado (<200 células/mm³) • Recomenda-se às pessoas com uma contagem de CD4 abaixo de 200 células/mm³ uma dose adicional da vacina administrada, como mínimo, aos 28 dias da segunda dose da pauta de vacinação. • Ver a ficha número 168
<p>Tríplice viral</p>	2 doses (0, 1 mês)	<ul style="list-style-type: none"> • É recomendada a pacientes que são seronegativos ao sarampo se a sua contagem de CD4 for superior a 200 células/mm³ durante pelo menos 6 meses • A mulheres seronegativas à rubéola se a sua contagem de CD4 for superior a 200 células/mm³ durante pelo menos 6 meses
<p>Varicela</p>	2 doses (0 e 3 meses)	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendável a pacientes seronegativos à varicela se a sua contagem de CD4 for acima de 200 células/mm³ • Não administrar a vacina tetra viral



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

Nota: O conteúdo desta ficha foi elaborado em setembro de 2021, razão pela qual as recomendações podem eventualmente não estar atualizadas. A informação não pretende substituir a recebida por um profissional de saúde. As decisões com respeito à saúde devem sempre ser tomadas após a recomendação de um profissional da saúde.

Fonte: Grupo de Trabalho Vacinação em população adulta e grupos de risco da Comunicação Programa e Registo de Vacinações. Vacinação em grupos de risco de todas as idades e em determinadas situações. Comissão de Saúde Pública do Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Ministério da Saúde, Consumo e Bem-Estar Social, julho de 2018.

Grupo de Trabalho Técnico de Vacinação COVID-19, da Comunicação Programa e Registo de Vacinações. Estratégia de vacinação contra a COVID-19 em Espanha. Atualização 9 modificada. 2 de novembro de 2021.



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org