

РЕКОМЕНДАЦИИ ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ВИЧ



Дети с ВИЧ хорошо переносят вакцинацию, которая дает им защиту от некоторых заболеваний, хоть и меньшую и менее продолжительную по времени по сравнению со средним показателем ВИЧ-отрицательного населения. Количество клеток CD4 – лучший прогностический фактор ответа на вакцину. Если у ребенка иммунодефицит, рекомендуется скорректировать антиретровирусную терапию, чтобы восстановить иммунитет перед вакцинацией, таким образом повысив ее эффективность. Информация, приведенная в данном буклете, может быть полезна семье и близкому окружению детей и подростков с ВИЧ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ВИЧ

Вакцина	Доза	Комментарии
Дифтерия, столбняк и коклюш <ul style="list-style-type: none"> • DTPa-VPI • dTra 	3 дозы: в возрасте 2, 4 и 11 месяцев 4 дозы: в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев	До рождения (dTra): Одна доза dTra во время беременности с 27-й недели гестации, предпочтительно на 27 или 28-й неделе. Систематическая вакцина в 6 лет: Комбинированная вакцина DTPa/VPI ставится детям, получившим три дозы вакцины до достижения 6 лет. Вакцинированным 4 дозами ставится одна доза dTra
Полиомиелит <ul style="list-style-type: none"> • VPI 	3 дозы: в возрасте 2, 4 и 11 месяцев 4 дозы: в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев	Систематическая вакцина в 6 лет: Комбинированная вакцина DTPa/VPI ставится детям, получившим три дозы вакцины до достижения 6 лет. Вакцинированным 4 дозами ставится одна доза dTra
Гемофильная инфекция (Haemophilus influenzae типа b) <ul style="list-style-type: none"> • PRP-T • DTPa-VPI-VHB +HiB 	3 дозы: в возрасте 2, 4 и 11 месяцев	Вакцинация детей Схема представляет собой три дозы DTPa-VPI-VHB+HiB Вакцинация подростков и молодежи Ранее невакцинированным подросткам до 18 лет ставится единственная доза

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENCIA DSD / SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO / COMISIÓN GENERAL DE OCUPIACIÓN / SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD / SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD / COMISIÓN GENERAL DE OCUPIACIÓN / SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL

✓ POR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya / Salut / Agència de Salut Pública de Catalunya

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona / ÀREA DE BENEFICÈNCIA SOCIAL

COL·LABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

Vall d'Hebron / eSPiC / Equip de salut pública i comunitària

¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

Вакцина	Доза	Комментарии
Гепатит В (ВГБ)	<p>3 дозы: в возрасте 2, 4 и 11 месяцев</p> <p>4 дозы: в возрасте 0, 2, 4 и 11 месяцев</p>	<p>Вакцинация детей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Применяется схема из трех доз в случае диспансеризации будущей матери • Для детей AgHBs-положительных матерей применяется схема из 4 доз. Первая доза ставится в первые 24 часа после рождения вместе с иммуноглобулином anti-HB • Если на 4-8 неделях жизни уровень антител слишком низкий, ставится вопрос о ревакцинации 3-й дозой через 6 месяцев) вакциной для взрослых <p>Вакцинация подростков и молодежи Ранее невакцинированным подросткам до 18 лет ставятся 3 дозы (0, 1 и 6 месяцев)</p>
<p>Пневмококк</p> <ul style="list-style-type: none"> • VNC13 • VNP23 	<p>Схема:</p> <p>4 дозы: в возрасте 0, 2, 4 и 11 месяцев +</p> <p>1 доза начиная с возраста 24 месяцев +</p> <p>1 доза (ревакцинация): через 5 лет после последней дозы</p>	<p>До 2 лет: VNC13 (2, 4, 6 и 11 месяцев) + VNP23 (с 24 месяцев). Ревакцинация VNP23 через 5 лет после последней дозы.</p> <p>Невакцинированные дети от 2 до 5 лет: 2 дозы VNC13 (с интервалом в 8 недель) + VNP23 (в промежуток начиная от 8 недель до 12 месяцев). Ревакцинация VNP23 через 5 лет после последней дозы</p> <p>Невакцинированные дети старше 5 лет: 1 доза VNC13 + VNP23 (интервал 12 месяцев, минимум 8 недель). Ревакцинация VNP23 через 5 лет после последней дозы</p>
Грипп	<p>1 доза каждый год</p> <p>2 дозы детям младше 9 лет, проходящим вакцинацию в первый раз (с минимальным интервалом в 4 недели)</p>	Инактивированная вакцина с 6 месяцев
Гепатит А (ВГА)	2 дозы в период 6 месяцев (0 и 6 месяцев)	Делается с 12-месячного возраста
Вирус папилломы человека (ВПЧ)	3 дозы в период 6 месяцев (0, 1-2 и 6 месяцев)	Ставится мальчикам и девочкам

Вакцина	Доза	Комментарии
<p>Менингококковая инфекция</p> <p>MenACWY: Конъюгированная менингококковая вакцина против серотипов A, C, W и Y</p>	<p>3 дозы: в возрасте 2, 4 и 11 месяцев</p> <p>2 дозы: первая доза + ревакцинация</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Детям младше 12 месяцев вакцина вводится в три дозы • Детям старше 12 месяцев вводится одна доза, а затем проводится ревакцинация в 12 лет • Может потребоваться последующая ревакцинация
<p>Вакцина MMR (против кори, паротита и краснухи)</p>	<p>2 дозы минимальным интервалом в 4 недели</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Вакцинация проводится с 12-месячного возраста • Противопоказана, если количество CD4 ниже 200 клеток/мм³, либо ниже 15% • Нельзя использовать тетравирусную вакцину
<p>Ветряная оспа</p>	<p>2 дозы минимальным интервалом в 3 месяца</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Вакцинация проводится с 12-месячного возраста • Противопоказана, если количество CD4 ниже 200 клеток/мм³, либо ниже 15% • Нельзя использовать тетравирусную вакцину

Комментарий: Этот буклет составлен в сентябре 2021 года, поэтому некоторые рекомендации могут устареть. Данная информация не ставит цель заменить информацию, полученную от медицинского работника. Решения относительно здоровья всегда должны приниматься после консультации с профессионалами-медиками.

Источник: Рабочая группа по вакцинации взрослого населения и групп риска Программы и реестра вакцинации. Вакцинация групп риска независимо от возраста и в конкретных ситуациях. Комиссия по вопросам общественного здоровья Межтерриториального совета Государственной системы здравоохранения. Министерство здравоохранения, потребления и социального благополучия, июль 2018.

Техническая рабочая группа по вакцинации против COVID-19, доклад Программы и реестра вакцинации. Стратегия вакцинации против COVID-19 в Испании. Редакция 9-я, исправленная. 2 ноября 2021 г.



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org