TABLA DE antirretrovirales

*Formulación(es) mostrada(s) en la imagen. § Incluyendo los comprimidos de ritonavir.

Esta tabla de fármacos ha sido elaborada originalmente por la organización británica NAM que autoriza a su contraparte en España, el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH), a realizar la traducción, adaptación y difusión. La actualización de esta tabla ha sido llevada a cabo por gTt-VIH e incluye información sobre los nuevos fármacos antirretrovirales autorizados desde diciembre de 2019 hasta la fecha de publicación de esta tabla.

Nota: La información contenida en esta tabla no pretende sustituir la recibida por un profesional sanitario. Las decisiones sobre la salud siempre deberían tomarse tras consultar con los profesionales sanitarios. Diciembre de 2021.





Nombre genérico Regimenes completos en un úr		comercial	Formulación		omprimi lo(s)/día		Restricciones alimentarias
Bictegravir/emtricitabina/	nico comprim Biktarvy	9882	Comprimido que contiene 50mg de bictegravir,	Un comprimido al día	3	Habituales: Depresión, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareo, cansancio	Se puede tomar
tenofovir alafenamida Darunavir/cobicistat/	Symtuza	0000	200mg de emtricitabina, 25mg de tenofovir alafenamida Comprimido que contiene 800mg de darunavir, 150mg de cobicistat,	Un comprimido al día	â	Raros: Conducta suicida Habituales: Reacción alérgica (hipersensibilidad), pérdida de apetito, sueños anómalos, diabetes, aumento de los niveles de lípidos o enzimas pancreáticas o hepáticas o de	con o sin alimento
emtricitabina/tenofovir alafenamida	Triumeg	(JG)	200mg de emtricitabina, 10 mg de tenofovir alafenamida			creatinina; dolor de cabeza, mareo, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, abotargamiento, indigestión, flatulencia, hinchazón facial, erupción cutánea, picor, dolor articular o muscular, cansancio, sensación de debilidad / Raros: Erupción cutánea grave con fiebre (síndrome de Stevens-Johnson) Habituales: Dificultad para dormir, somnolencia, sueños anómalos, depresión, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, fatiga, erupción cutánea, picor, vómitos, dolor estomacal, mareo,	Tomar con alimentos Se puede tomar
Dolutegravir/abacavir/ lamivudina	50 SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE	572 117	SOmg de dolutegravir, 600mg de abacavir, 300mg de lamivudina	Un comprimido al día	1	pérdida de cabello, flatulencia, dolor abdominal, abotargamiento, dolor y molestias musculares, dolor articular, nariz irritada o secreción nasal, tos, indigestión, reflujo gástrico y pérdida de apetito / Raros: Reacción alérgica (hipersensibilidad), acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), pensamientos suicidas	con o sin aliment
Dolutegravir/rilpivirina	Juluca	5W 13T	Comprimido que contiene 50mg de dolutegravir y 25mg de rilpivirina	Un comprimido al día	1	Habituales: Disminución del recuento de glóbulos blancos, hemoglobina o plaquetas, aumento del colesterol total o el LDL, reducción del apetito, aumento de los triglicéridos, dificultad para dormir, sueños anómalos, depresión, ánimo depresivo, ansiedad, dolor de cabeza, mareo, letargo, náuseas, diarrea, dolor abdominal, vómitos, flatulencia, sequedad de boca, aumento de las enzimas hepáticas o bilirrubina o creatinina fosfoquinasa o lipasa o amilasa pancreática, erupción cutánea, picor, fatiga / Raros: Pensamientos o conductas suicidas	Tomar junto con una comida
Dolutegravir/lamivudina	Dovato	(SV 137	Comprimido que contiene 50mg de dolutegravir y 300 mg de lamivudina	Un comprimido al día	1	Habituales: Dolor de cabeza, diarrea, náuseas, depresión, dificultad para conciliar el sueño, somnolencia, sueños anormales, dolor o molestias en el estómago, erupción cutánea, picor, vómitos, flatulencia, mareo, cansancio, pérdida de cabello, ansiedad, dolor articular, dolor muscular. / Raros: Insuficiencia hepática, hinchazón, a veces de la cara o la boca; inflamación del páncreas, acidosis láctica (exceso de ácido láctico en la sangre), entumecimiento, sensación de hormigueo en la piel, sensación de debilidad en las extremidades	Se puede tomar con o sin aliment
Doravirina/lamivudina/ tenofovir disoproxil fumarato	Delstrigo	Q776	Comprimido que contiene 100mg de doravirina, 300mg de lamivudina, 245mg de tenofovir disoproxil fumarato	Un comprimido al día	11	Habituales: Sueños anómalos, dificultad para dormir, pesadillas, depresión, dolor de cabeza, mareo, letargo, tos, nariz irritada o secreción nasal, náuseas, diarrea, dolor abdominal, vómitos, pérdida de cabello, erupción cutánea, problemas musculares, fatiga, fiebre / Raros: Acidosis láctica (demasiado ácido láctico en sangre), pensamientos suicidas, hepatitis, fallo o daño renal agudo	Se puede tomar con o sin aliment
Efavirenz/emtricitabina/ tenofovir disoproxil fumarato Medicamento genérico, su aspecto puede variar		genérico	Comprimido que contiene 600mg de efavirenz, 200mg de emtricitabina, 245mg de tenofovir disoproxil fumarato	Un comprimido al día	1	Habituales: Dificultad para dormir, cansancio, sueños anómalos, problemas de concentración, mareo, erupción cutánea, picor, náuseas, vómitos, diarrea, sequedad de boca, dolor de cabeza, ansiedad, depresión, aumento de los niveles de enzimas hepáticas, amilasa o creatina quinasa; oscurecimiento de la piel, niveles bajos de fosfato en la sangre, debilidad, dolor de estómago, abotargamiento, flatulencia, indigestión, pérdida de apetito, aumento de los niveles de azúcar y triglicéridos en sangre Raros: Reacción alérgica (hipersensibilidad), acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), psicosis, inflamación hepática	Tomar con el estómago vacío, preferentement al acostarse
Elvitegravir/cobicistat/ emtricitabina/tenofovir alafenamida	Genvoya	510	Comprimido que contiene 150mg de elvitegravir, 150mg de cobicistat, 200mg de emtricitabina, 10mg de tenofovir alafenamida	Un comprimido al día	910	Habituales: Sueños anómalos, dolor de cabeza, mareo, náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal, flatulencia, erupción cutánea, cansancio Raros: Depresión, hinchazón de la piel, cara, labios, lengua o garganta	Tomar con alime
Elvitegravir/cobicistat/ emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato	Stribild		Comprimido que contiene 150mg de elvitegravir, 150mg de cobicistat, 200mg de emtricitabina, 245mg de tenofovir disoproxil fumarato	Un comprimido al día	1	Habituales: Náuseas, diarrea, vómitos, sueños anómalos, dolor de cabeza, fatiga, mareo, insomnio, erupción cutánea, picor, dolor abdominal, abotargamiento, flatulencia, estrefilmiento, somnolencia, debilidad, oscurecimiento de la piel, recuento bajo de glóbulos blancos, niveles bajos de fosfato en la sangre, niveles elevados de triglicéridos y azúcar en sangre, niveles elevados de enzimas hepáticas, amilasa, creatinina o creatina quinasa / Raros: Acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), fallo renal	Tomar con alime
Rilpivirina/ emtricitabina/tenofovir alafenamida	Odefsey	GSI	Comprimido que contiene 25mg de rilpivirina, 200mg de emtricitabina, 25mg de tenofovir alafenamida	Un comprimido al día	a	Habituales: Dificultad para dormir, sueños anómalos, depresión, dolor de cabeza, mareo, pérdida de apetito, náuseas, dolor abdominal, vómitos, sequedad de boca, indigestión, flatulencia, diarrea, erupción cutánea, cansancio, recuento bajo de glóbulos blancos o rojos, recuento bajo de plaquetas, niveles elevados de lípidos o de enzimas pancreáticas o hepáticas / Raros: Erupción cutánea grave y fiebre	Tomar con alime
Rilpivirina/ emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato	Eviplera	(621)	Comprimido que contiene 25mg de rilpivirina, 200mg de emtricitabina, 245mg de tenofovir disoproxil fumarato	Un comprimido al día	11/	Habituales: Aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, pérdida de apetito, depresión, trastornos del sueño, sueños anómalos, somnolencia, náuseas, vómitos, diarrea, mareo, insomnio, dolor de cabeza, debilidad, erupción cutánea, picor, dolor abdominal, sequedad de boca, fatiga, abotargamiento, flatulencia, alteraciones de la función renal, aumento de los níveles de enzimas hepáticas, amilasa o creatina quinasa, níveles bajos de fosfato en la sangre, oscurecimiento de la piel, recuento bajo de glóbulos blancos	Tomar con alime
Régimen completo en suspens	ión inyectable	e de liberación pr	And the second s			Raros: Acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), fallo renal	
Cabotegravir y rilpivirina	Vocabria y Recambys	2000	400 y 600mg de cabotegravir en suspensión inyectable de libeación prolongada 600 y 900mg de rilpivirina en suspensión inyectable de liberación prolongada	Una inyección intramuscular mensual de 400mg de cabotegravir (con una dosis de carga inicial de 600mg) o bimestral de 600mg Una inyección intramuscular mensual de 600mg de rilpivirina (con una dosis de carga inicial de 900mg) o bimestral de 900mg	No procede	Habituales: Reacciones en el lugar de inyección (leves o moderadas), disminución del recuento de glóbulos blancos, disminución de la hemoglobina, disminución del recuento de plaquetas, aumento del colesterol total (en ayunas), aumento del colesterol LDL (en ayunas), falta de apetito, aumento de los triglicéridos (en ayunas), depresión, ansiedad, sueños anómalos, insomnio, trastornos del sueño, estado depresivo, dolor de cabeza, mareos, aumento de amilasa pancreática, náuseas, vómitos, dolor abdominal, flatulencia, diarrea, sequedad de boca, aumento de lipasa en sangre, exantema, mialgia, sensación de calor, cansancio, fatiga, astenia, malestar, aumento de peso y dolores musculares Raros: Toxicidad hepática, reacciones graves en el punto de inyección, aumento de las transaminasas, aumento de la bilirrubina en sangre, somnolencia	Sin restricciones alimentarias para su administra
Inhibidores de la transcriptasa	inversa análo Emtriva	gos de nucleósid		200mg una vez al día	1	Habituales: Náuseas, diarrea, vómitos, indigestión, dolor de cabeza, mareo, debilidad, fatiga, aumento de los niveles de enzimas hepáticas, amilasa o creatina quinasa, aumento de los niveles de enzimas hepáticas, amilasa o creatina quinasa, aumento de los niveles de enzimas hepáticas, amilasa o creatina quinasa, aumento	Se puede tomar
Emtricitabina Lamivudina Medicamento genérico, su aspecto puec	42797223546.00.000000	genérico	Cápsula de 200mg Comprimidos de 150 y 300mg	150mg dos veces al día	2	de los niveles de azúcar y triglicéridos en sangre, erupción cutánea, picor, oscurecimiento de la piel, insomnio, sueños anómalos Raros: Acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), daño hepático Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, sensación general de malestar, tos, secreción nasal, dolor abdominal, pérdida de cabello, fiebre, insomnio, erupción cutánea,	Se puede tomal con o sin alimer
Tenofovir disoproxil fumarato Medicamento genérico, su aspecto pued		genérico	Comprimido de 245mg	o 300mg una vez al día 245mg una vez al día	1	cansancio, dolor muscular y articular / Raros: Acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), daño hepático Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, mareo, níveles bajos de fosfato en la sangre, elevación de las enzimas hepáticas, debilidad, erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor abdominal, abotargamiento / Raros: Problemas renales, adelgazamiento óseo	Tomar con alim
Zidovudina Medicamento genérico, su aspecto pued	25 db	genérico	Cápsula de 250mg	250mg dos veces al día	2	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, sensación general de malestar, dolor de estómago, fatiga, dolor de cabeza, mareo, debilidad, dolor muscular, pérdida de apetito Raros: Trastornos sanguineos, lipodistrofia, acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), problemas hepáticos, pancreatitis	Se puede toma con o sin alime
Combinaciones de ITIN/ITINt e	en dosis fija		Comprimido que contiene 600mg de	Un comprimido al día	î	Habituales: Dolor de cabeza, dolor abdominal, pérdida de cabello, insomnio, cansancio, pérdida de apetito, secreción nasal, dolor articular	Se puede toma
Medicamento genérico, su aspecto pued Emtricitabina/tenofovir	de variar Descovy	225	abacavir y 300mg de lamivudina Comprimido que contiene 200mg de	Un comprimido al día. La versión de	ī	Raros: Reacción alérgica (hipersensibilidad), acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre) Habituales: Dolor de cabeza, mareo, sueños anómalos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, flatulencia, indigestión, erupción cutánea, cansancio	con o sin alimer
alafenamida Emtricitabina/tenofovir disopro	oxil	genérico	emtricitabina y 10mg o 25mg* de tenofovir alafenamida Comprimido que contiene 200mg de	10mg está recomendada en combinación con algunos inhibidores de la proteasa Un comprimido al día	1	Raros: Hinchazón de la piel, cara, labios, lengua o garganta Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, insomnio, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareo, reacción alérgica, erupción cutánea, picor, debilidad, dolor abdominal, fatiga,	con o sin alimer
fumarato Medicamento genérico, su aspecto pued		generico	emtricitabina y 245mg de tenofovir disoproxil fumarato			abotargamiento, flatulencia, ardor de estórnago, niveles elevados en sangre de azúcar, enzima pancreática y triglicéridos, niveles elevados de enzima hepática o creatina quinasa, niveles bajos de fosfato en la sangre, oscurecimiento de la piel, recuento bajo de glóbulos blancos / Raros : Fallo renal, acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), adelgazamiento óseo, pancreatitis	puede tomarse el estómago vac
Lamivudina/zidovudina Medicamento genérico, su aspecto pued Inhibidores de la integrasa	de variar	genérico	Comprimido que contiene 150mg de lamivudina y 300mg de zidovudina	Un comprimido dos veces al día	2	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, cansancio, dolor de cabeza, mareo, debilidad, dolor muscular, pérdida de apetito, fiebre, dolor abdominal, pérdida de cabello, insomnio, erupción cutánea, tos, secreción nasal, dolor muscular o articular, pérdida de grasa, anemia, recuento bajo de glóbulos blancos, elevación de las enzimas hepáticas Raros: Daño hepático, anemia grave, acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre)	Se puede tomar con o sin alimen
Dolutegravir	Tivicay	50	Comprimido de 50mg	50mg una vez al día o 50mg dos veces al día, si se toma con efavirenz, nevirapina o tipranavir, o en el caso de que se sepa que el VIH es resistente a los inhibidores de la integrasa	102	Habituales: Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, erupción cutánea, picor, vómitos, dolor o molestia abdominal, dificultad para dormir, mareo, sueños anómalos, fatiga, flatulencia, aumento de las enzimas hepáticas, aumento de la creatina fosfoquinasa (enzimas producidas en los músculos) Raros: Reacción alérgica -hipersensibilidad- (erupción cutánea, fiebre, dolor muscular, formación de ampollas), inflamación hepática	Se puede toma con o sin alimer
Cabotegravir	Vocabria	SUCTO	Comprimido que contiene 30mg	Un comprimido al día	ĩ	Habituales: Depresión, ansiedad, sueños anómalos, insomnio, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, erupción cutánea, dolores musculares, fatiga, cansancio, malestar, sensación de calor, aumento de peso / Raros: Somnolencia, toxicidad hepática, aumento de las transaminasas, aumento de la bilirrubina en sangre	Se puede tomar con o sin alimer
Raltegravir	Isentress	227	Comprimidos de 400* y 600mg	400mg dos veces al día • dos comprimidos de 600mg una vez al día	2	Habituales: Pérdida de apetito, dolor de cabeza, dificultad para dormir, sueños anómalos, depresión, mareo, vértigo, agitación, dolor abdominal, abotargamiento, flatulencia, diarrea, náuseas, vómitos, indigestión, erupción cutánea, debilidad, fatiga, fiebre, aumento de las enzimas hepáticas o pancreáticas, aumento de los triglicéridos Raros: Reacción alérgica -hipersensibilidad- (erupción cutánea, fiebre, dolor muscular, formación de ampollas), pensamientos y conductas suicidas, fallo hepático, fallo renal	Se puede tomar con o sin alimen
Inhibidores de la transcriptasa		álogos de nucleó	sido (ITINN)				
Doravirina	Pifeltro	\$700)	Comprimido de 100mg	100mg una vez al día	102	Habituales: Sueños anómalos, dificultad para dormir, pesadillas, depresión, dolor de cabeza, mareo, letargo, náuseas, diarrea, dolor abdominal, vómitos, erupción cutánea, cansancio / Raros: Pensamientos suicidas, daño renal agudo	Se puede tomar con o sin alimen Tomar con el
Efavirenz Medicamento genérico, su aspecto puede variar		genérico	Comprimido de 600mg y cápsula de 200mg	600mg una vez al día	103	Habituales: Erupción cutánea, picor, mareo, dolor de cabeza, sueños anómalos, ansiedad, depresión, dificultad para dormir, problemas de concentración, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cansancio, niveles elevados de triglicéridos y enzimas hepáticas / Raros: Erupción cutánea grave, psicosis, tendencias suicidas, fallo hepático	estómago vacío preferentement al acostarse
Etravirina	Intelence		Comprimidos de 100 y 200mg*	200mg dos veces al día	204	Habituales: Anemia, recuento bajo de plaquetas, diabetes; niveles elevados en sangre de azúcar, triglicéridos o colesterol; ansiedad, dificultad para dormir, dolor de cabeza, infarto de miocardio, hipertensión arterial, indigestión y reflujo ácido, diarrea, náuseas, vómitos, flatulencia, dolor abdominal, fallo renal, cansancio, erupción cutánea, neuropatía periférica (daño en los nervios de manos o pies) / Raros: Erupción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson)	
Nevirapina Medicamento genérico, su aspecto puede variar		genérico	Comprimidos de 200mg y 400mg (liberación prolongada)	200mg una vez al día durante dos semanas y después 200mg dos veces al día o 200mg una vez al día durante dos semanas y, posteriormente, 400mg una vez al día	201	Habituales: Reacción alérgica (hipersensibilidad), dolor de cabeza, erupción cutánea (por lo general, en las primeras seis semanas de tratamiento), fatiga, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, elevación de las enzimas hepáticas, hipertensión arterial / Raros: Erupción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson)	Se puede tomar o sin alimentos. Tragar el compri de 400mg ente
Rilpivirina	Edurant	ZŠ)	Comprimido de 25mg	25mg una vez al día	Ĩ	Habituales: Insomnio, dolor de cabeza, náuseas, erupción cutánea, depresión, mareo, dolor abdominal, vómitos, reducción del recuento de glóbulos blancos o rojos, recuento bajo de plaquetas, niveles elevados de colesterol o triglicéridos o enzimas hepáticas o amilasa o lipasa pancreáticas, disminución del apetito, dificultad para dormir, sueños anómalos, ánimo decaído, cansancio, letargo, sequedad de boca / Raros: Erupción cutánea grave y reacción alérgica (hipersensibilidad)	Tomar junto con una comida principal
Inhibidores de la proteasa Atazanavir			Cápsulas de 150, 200	300mg con 100mg	2035	Habituales: Náuseas, diarrea, erupción cutánea, dolor abdominal, dolor de cabeza, vómitos, ardor de estómago, cansancio, aumento de los niveles de bilirrubina (pudiendo llevar	Tomar con
Medicamento genérico, su aspecto pue Atazanavir / cobicistat	de variar <i>Evotaz</i>	genérico SE	y 300mg Comprimido que contiene 300mg	de ritonavir una vez al día Un comprimido al día	1	a ictericia) / Raros: Piedras renales, erupción cutánea grave y fiebre, alteraciones del ritmo cardiaco Habituales: Aumento del apetito, dificultad para dormir, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareo, alteración del gusto, aumento de los niveles de bilirrubina (pudiendo llevar a ictericia), náuseas, vómitos, diarrea, indigestión, dolor abdominal, abotargamiento, flatulencia, sequedad de boca, erupción cutánea, cansancio / Raros: Piedras renales, erupción	alimentos Tomar con
Darunavir Medicamento genérico su aspecto que	24.23.47	genérico	de atazanavir y 150mg de cobicistat Comprimidos de 600	800mg con 100mg de ritonavir una vez al día o 600mg	2a4§	cutánea grave y fiebre, alteraciones del ritmo cardiaco	Tomar con alimentos
Medicamento genérico, su aspecto pue Darunavir / cobicistat	Rezolsta	EGO	y 800mg Comprimido que contiene 800mg de darunavir	con 100mg de ritonavir dos veces al día Un comprimido al día	1	hepáticas / Raros: Función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardiaco Habituales: Diarrea, vómitos, náuseas, indigestión, erupción cutánea, picor, dolor abdominal, abotargamiento, flatulencia, dolor de cabeza, pérdida de apetito, sueños anómalos,	Tomar con
Lopinavir / ritonavir	Kaletra		y 150mg de cobicistat Comprimido que contiene	Dos comprimidos dos veces	4	cansancio, diabetes, aumento de los niveles de creatina o amilasa o triglicéridos o colesterol o enzimas hepáticas / Raros: Función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardiaco Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, abotargamiento, flatulencia, cansancio, debilidad, dolor de cabeza, ardor de estómago e indigestión, pancreatitis, aumento de lípidos o azúcar en sangre, diabetes, hipertensión arterial, elevación de las enzimas hepáticas, tos, irritación de garganta, secreción nasal, infecciones sinusales,	Tragar entero. Se puede
	11		200mg de lopinavir y 50mg de ritonavir	al día o cuatro comprimidos una vez al día		aumento de lipidos o azucar en sangre, diabetes, injertension artenal, elevación de las enzimas nepaticas, tos, irritación de garganta, secreción nasal, infecciónes, infecciónes de la piel, erupción cutánea, picor, hinchazón alérgica, daño en los nervios periféricos, dificultad para dormir, mareo, dolor muscular, disfunción eréctil, trastornos menstruales / Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco, función renal reducida	tomar con o sin alimentos
Inhibidores de la entrada / acop		0 -	2 12 5	300mg dos veces al día o 150mg dos veces al día con un inhibidor de la proteasa		Habituales: Hipotensión postural (mareo al levantarse muy rápido), anemia, náuseas, diarrea, dolor abdominal, abotargamiento, pérdida de apetito, flatulencia, debilidad,	
Maraviroc	Celsentri		Comprimidos de 150* y 300mg	potenciado por ritonavir (excepto tipranavir y fosamprenavir) o 600mg dos veces al día con efavirenz o etravirina sin un inhibidor de la proteasa potenciado por ritonavir	2a4	depresión, dificultad para dormir, niveles elevados de enzimas hepáticas, erupción cutánea / Raros : Problemas hepáticos, reacción alérgica (hipersensibilidad) incluyendo picor, erupción cutánea, amarilleo de los ojos, vómitos, orina de color oscuro y dolor abdominal en el lado derecho	Se puede toma con o sin alimer
Fostemsavir	Rukobia		Comprimido de liberación prolongada que contiene 600mg	Un comprimido cada 12 horas	2	Habituales: Síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, insomnio, dolor de cabeza, somnolencia, mareos, alteración del gusto, prolongación del intervalo QT en electrocardiograma, diarrea, náuseas, dolor abdominal, vómitos, dispepsia, flatulencia, transaminasas elevadas, erupción cutánea, dolor muscular, picores, fatiga, niveles elevados de creatinina en sangre / Raros: Aumento de la bilirrubina en sangre, aumento de la creatinfosfoquinasa en sangre	Se puede tomar con o sin alimen
Ibalizumab	Trogarzo	Togast Togast Togast Togast Togast Togast	200mg de ibalizumab en concentrado en solución para perfusión	Dosis de carga única de 2.000mg seguida de dosis de mantenimiento de 800mg cada 2 semanas. El fármaco debe diluirse previamente y administrarse por perfusión venosa	No procede	Habituales: Mareo, cefalea, parestesia, diarrea, náuseas, vómitos, exantema, dermatitis, sequedad de piel y cansancio Raros: Efectos secundarios raros: Hipersensibilidad, síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, extrasístoles ventriculares, anomalías en el electrocardiograma, temblores, hipertensión, hipertensión lábil, hipotensión ortostática, sequedad de boca, pápulas, eritema, picores, sensación de calor	Sin restricciones alimentarias para su administra
Potenciadores de otros fármac			Comprimido de 150mg	Un comprimido al día	ì	Habituales: Nivel elevado de azúcar en sangre, aumento del apetito, dificultad para dormir, letargo, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareo, alteración del gusto, náuseas,	Tomar con
Cobicistat	Tybost Norvir	(SI)	Comprimido de 150mg Comprimido de 100mg	Un comprimido al dia Para 'potenciar' a otros inhibidores de	1a4	diarrea, dolor abdominal, abotargamiento, latulencia, sequedad de boca, ictericia, erupción cutánea y cansancio / Raros: Cálculos renales Habituales (a dosis reducida): Niveles elevados de lípidos	alimentos Tragar entero. To
CONSTRUCTOR	, 101 111	EINN	\$2.0	la proteasa 100-200mg una o dos veces al día		Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco, reacción alérgica grave (hipersensibilidad) y erupción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson)	con alimentos p evitar náuseas