

## توصيات لتلقيح الأشخاص الحاملين لفيروس VIH

قد يكون الأشخاص الحاملون لفيروس VIH أكثر عرضة للإصابة بعدوى معينة، خاصة إذا كان جهازهم المناعي ضعيف. لهذا السبب، يوصى بتلقيحهم بمعظم اللقاحات المدرجة في جدول التطعيم. هناك بعض التوصيات والتحذيرات الموجهة بشكل خاص للأشخاص الحاملين لفيروس VIH فيما يتعلق ببعض اللقاحات. يحتوي هذا الملف على معلومات وإرشادات قد تكون مفيدة لمناقشة هذه المشكلة مع الفريق الطبي الذي يعالجك.

## لقاح

## جرعات

## تعليقات

## المكورات الرئوية

- **PCV13**: لقاح مضاد للمكورات الرئوية المترافقة ضد 13 نوعاً من البكتيريا
- **PPV23**: لقاح المكورات الرئوية غير المقترن ضد 23 نوعاً من البكتيريا

جرعتان خلال 8 أسابيع

البالغون الغير الملقحين:  
جرعة واحدة من PCV13 ثم جرعة أخرى (بعد 8 أسابيع على الأقل) من PPV23

- البالغون الذين تم تلقيحهم بـ **PPV23**:
- جرعة واحدة من PCV13 بعد سنة على الأقل من آخر جرعة من PPV23 ؛ أو
- جرعة واحدة من PPV23 كل عام لمدة 5 سنوات.

## أنفلونزا

1 جرعة سنوية

- يوصى بالتلقيح كل عام.
- يجب استعمال لقاح غير نشيط و غير مكرر.

لقاح	جرعات	تعليقات
إلتهاب الكبد ب (VHB)	3 أو 4 جرعات في 6 أشهر	<ul style="list-style-type: none"> <li>من المستحسن إعطاء ثلاث حقن بجرعات عالية (0، 1 و 6 أشهر) أو،</li> <li>إعطاء أربع حقن بجرعات منخفضة الجرعات (0، 1، 2 و 6 أشهر)</li> <li>التحقق من مستويات الأجسام المضادة، في حالة وجودها غير كافية، يجب إعطاء ثلاث حقن جديدة بجرعات عالية شهرياً أو إعادة التطعيم بنفس الجدول الزمني.</li> </ul>
إلتهاب الكبد أ (VHA)	2 أو 3 جرعات في فترة 6 أشهر	<ul style="list-style-type: none"> <li>ينصح بتناول جرعتين (0، 6 شهر) للأشخاص الذين تزيد تعداد خلايا CD4 لديهم عن 350 خلية / مم مكعب.</li> <li>يوصى بجدول من ثلاث جرعات (0، 1، 6 أشهر) للأشخاص الذين لديهم تعداد CD4 أعلى من 350 خلية/مم مكعب.</li> </ul>
فيروس الورم الحليمي البشري (VPH)	3 جرعات في فترة 6 أشهر (0، 1-2 و 6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>يوصى بلقاح للأشخاص الحاملين لفيروس VIH حتى 26 عامًا أو 45 عامًا حسب الجهة المستقلة.</li> <li>يوصى بلقاح تساعي التكافؤ.</li> <li>انظر الملف رقم 147.</li> </ul>
المكورات السحائية	جرعتان (0، شهرين)	<ul style="list-style-type: none"> <li>يوصى بلقاح MenACWY</li> <li>سيتم تقييم الجرعات المعززة عند 5 سنوات</li> </ul>
الكزاز	5 جرعات. سيتم النظر في الجرعات الإضافية كل 10 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا تم تلقيح الشخص بشكل صحيح (5 جرعات)، فيمكن تقييم هذه الحالات كل 10 سنوات في حالات خطر التعرض.</li> </ul>
SARS-CoV-2 (كوفيد 19)	جرعتان (0-21 يوم أو 28-0 يوم) أو جرعة واحدة سيتم النظر في الجرعات المنتشرة أو الجرعات الإضافية في ظروف معينة	<ul style="list-style-type: none"> <li>يوصى بلقاحات ARNm للأشخاص الحاملين لفيروس VIH الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة (أقل من 200 خلية / مم مكعب)</li> <li>بالنسبة للأشخاص الذين لديهم عدد CD4 أقل من 200 خلية / مم مكعب، يوصى بجرعة إضافية من اللقاح بعد 28 يومًا على الأقل من الجرعة الثانية من نظام التطعيم.</li> <li>انظر الملف رقم 168</li> </ul>

لقاح

تعليقات

جرعات

تعليقات	جرعات	لقاح
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يوصى به لمرضى الذين ليس لهم مضادات الأجسام لمرض الحصبة، حيث عدد خلايا CD4 لديهم أعلى من 200 خلية / مم مكعب لمدة 6 أشهر على الأقل</li> <li>• النساء اللاواتي ليس لديهم مضادات الأجسام لمرض الحصبة الألمانية، حيث عدد CD4 لديهن أعلى من 200 خلية / مم مكعب، لمدة 6 أشهر على الأقل.</li> <li>لا ينصح به وغير مناسب للأشخاص الذين يعانون من إكتئاب المناعة الشديد</li> </ul>	جرعتان (0، 1 شهر)	التطعيم الثلاثي الفيروسي
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يوصى به للمرضى الذين ليس لهم مضادات الأجسام لمرض الجدري، حيث يكون عدد خلايا CD4 لديهم أعلى من 200 خلية / مم مكعب.</li> <li>• لا تستخدم اللقاح الرباعي الفيروسي.</li> <li>• لا ينصح به وغير مناسب للأشخاص الذين يعانون من إكتئاب المناعة الشديد</li> </ul>	• جرعتان (0 و 3 أشهر)	الجدري
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اللقاح موجه للأشخاص المصابين بفيروس VIH ابتداءً من سن 18 عاماً</li> <li>• يجب على المصابين السيطرة على العدوى من خلال العلاج المضاد للفيروسات القهقرية لمدة سنة واحدة على الأقل</li> </ul>	• جرعتان (0 و 2 أشهر)	الهريس النطاقي لقاح مؤتلف مساعد
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم إعطاء أولوية اللقاح للأشخاص المصابين بفيروس VIH الذين لم يصابوا بالمرض من قبل، والذين إنخرطو في الممارسات الجنسية العالية الخطورة، و</li> <li>• لدى الأشخاص المصابين بفيروس VIH الذين كانوا على إتصال وثيق بحالة مؤكدة</li> </ul>	جرعتان (0، شهر واحد)	جدري القردة

ملاحظة: تم إعداد محتوى هذه الورقة في سبتمبر 2022، لهذا قد تكون هذه التوصيات غير حديثة. هذا لا يعني أن تحل هذه المعلومات محل تلك التي حصل عليها أخصائي الرعاية الصحية. يجب دائماً اتخاذ القرارات الصحية بالتشاور مع المتخصصين في الرعاية الصحية.


## المصادر:

مجموعة العمل للتطعيم في الفئات البالغة والمجموعات المعرضة للخطر لورقة البرنامج وسجل التطعيمات. التطعيم في الفئات المعرضة للخطر من جميع الأعمار وفي حالات معينة لجنة الصحة العامة التابعة للمجلس المشترك بين الأقاليم لنظام الصحة الوطني. وزارة الصحة والاستهلاك والرعاية الاجتماعية، يوليو 2018.

لعرض برنامج التطعيم والسجل. COVID-19 مجموعة العمل الفنية للتطعيم في إسبانيا. التحديث المعدل 8 فبراير COVID-19 استراتيجية التطعيم ضد 2022.

توصيات التلقيح ضد جدري القردة من خلال عرض البرنامج وسجلات التلقيحات. لجنة الصحة العامة التابعة للمجلس الإقليمي لنظام الصحة الوطني. وزارة الصحة، أغسطس 2022.

فريق عمل لقاح ضد الهربس النطاقي التابع لعرض برنامج وسجلات التلقيحات. لجنة الصحة العامة التابعة للمجلس الإقليمي لنظام الصحة الوطني. وزارة الصحة، مايو 2021.



**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS  
Tel. 93 458 26 41

### تتصل من المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ليس المقصود بها أن تحل محل تلك التي حصلت عليها من طرف الطبيب. يجب دائماً إتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة بالتشاور مع المهنيين المتخصصين في ميدان الصحة. يمكن أن تصبح هذه المعلومات الطبية قديمة أو ملغاة أو باطلة بسرعة.

إذا كنت لديك أي أسئلة بعد قراءة هذه الوثيقة، فننصحك بالتحدث إلى طبيبك أو ممرضتك أو الاتصال بـ 93 458 26 41، al gTt-VIH، للتحقق مما إذا كانت هناك أي معلومات جديدة ذات صلة بهذا الصدد.

### SUBVENCIONA

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

### COLABORA



ETIS  
EQUIP DE TREBALL SOBRE  
INMIGRACIÓ I SALUT

[www.gtt-vih.org](http://www.gtt-vih.org)

SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE  
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.

