

SÍFILIS



La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria *Treponema pallidum*.



TRANSMISIÓN

Se puede contraer cuando se mantienen relaciones sin preservativo con una persona infectada a través del sexo anal, vaginal u oral. Las mujeres embarazadas pueden transmitir la enfermedad a su hijo.



SÍNTOMAS

Los síntomas son los mismos en hombres y mujeres, varían según la etapa de la infección y no siempre aparecen. Los primeros síntomas suelen aparecer al cabo de 2-3 semanas. La sífilis se manifiesta en cuatro fases diferenciadas, por lo tanto, el periodo de aparición de síntomas dependerá de la fase en la que se encuentre la infección.

Sífilis primaria

Aparición de una úlcera (chancro) no dolorosa en la parte del cuerpo que ha estado en contacto con la bacteria (sobre todo en pene, vulva, vagina o ano), generalmente a las 2-3 semanas después de la infección. Puede tardar en desaparecer hasta 6 semanas y, dependiendo de su localización, puede pasar desapercibida.

Sífilis secundaria

Suele producirse de 3-6 semanas después de la aparición del chancro. Sus síntomas incluyen: erupción cutánea (palmas de las manos y plantas de los pies), inflamación en la zona genital, manchas blancas en la boca y glándulas inflamadas. Aunque no se reciba tratamiento, los síntomas suelen desaparecer, pero la infección sigue progresando. En esta etapa, la sífilis es altamente transmisible por vía sexual.

Sífilis latente

Cuando los síntomas de la sífilis secundaria han desaparecido, es posible que no se produzcan síntomas durante varios años, aunque la infección esté presente.

Sífilis terciaria

Muchos años después de la infección, aproximadamente 1 de cada 10 personas con sífilis no tratada desarrollará graves problemas neurológicos, osteoarticulares o cardíacos.



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la sífilis se hace a través de un análisis de sangre y, en caso de presencia de úlceras, también se pueden tomar muestras. Las pruebas rápidas de la sífilis que detectan la presencia de anticuerpos no son útiles para diagnosticar una reinfección.



TRATAMIENTO

La infección se cura con un antibiótico. El tratamiento no genera protección para toda la vida, por lo que se puede volver a contraer la infección.



PREVENCIÓN

El preservativo reduce el riesgo de infección en el sexo vaginal, anal u oral. Si se comparten juguetes sexuales, es importante usar un preservativo nuevo para cada persona y para cada práctica sexual. Se recomienda evitar las relaciones sexuales hasta que finalice el tratamiento y desaparezcan los síntomas.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO / MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

FOR SOLEDADEG / OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya / Agència de Salut Pública de Catalunya / Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS / Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT / TROPICAL DRASSANES



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org