

## ГОНОРЕЯ



Гонорея – инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), возбудителем которой является бактерия *Neisseria Gonorrhoeae* (или гонококк).



### ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

Гонореей можно заразиться после полового контакта без презерватива с инфицированным человеком, будь то анальный, вагинальный или оральный секс. Беременные женщины могут передать инфекцию своему ребенку.



### СИМПТОМЫ

У более 50% женщин и 10% мужчин болезнь протекает бессимптомно. Инфекция в заднем проходе и в горле чаще всего никак себя не проявляет. Если симптомы все-таки дают о себе знать, обычно это происходит через 2-7 часов после полового контакта, иногда позже. Симптомы могут включать в себя:



#### У женщин

- Изменение цвета, запаха или количества выделений из влагалища
- Кровотечения между месячными или более обильные месячные
- Жжение при мочеиспускании
- Возможны боли или неприятные ощущения в нижней части живота



#### У мужчин:

- Жжение при мочеиспускании
- Раздражение или болезненность вокруг уретры
- Гнойные выделения из пениса
- Возможны болевые ощущения в области яичек
- Неприятные ощущения при эякуляции



### ДИАГНОЗ

Обычно диагноз гонорея ставится по результатам анализа мочи и/или мазка из заднего прохода, уретры или глотки.



### ЛЕЧЕНИЕ

Инфекция лечится антибиотиком, однако излечение не гарантирует пожизненный иммунитет. Это значит, что гонореей можно заразиться повторно.



### ПРОФИЛАКТИКА

Использование презерватива сокращает риск заражения при вагинальном, анальном и оральном сексе. При совместном использовании секс-игрушками важно надевать новый презерватив с каждым партнером и каждой секс-практикой. Рекомендуется воздержаться от половой жизни до окончания лечения или исчезновения симптомов.

**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

#### SUBVENCIÓN



FOR SOLIDARIDAD  
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



#### COLABORA



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org