

HERPES GENITAL



El herpes genital es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por el virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2). El virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1) –que afecta habitualmente a labios y zonas próximas– en determinadas ocasiones puede afectar a la zona genital y anogenital.



01 TRANSMISIÓN

Se puede contraer cuando se mantienen relaciones sin preservativo a través del sexo anal, vaginal u oral o por contacto genital estrecho con una persona infectada. También puede transmitirse a partir de las lesiones cutáneo-mucosas o a través de las secreciones en las que está presente el virus, aunque no haya lesiones.

Una vez se produce la infección por el VHS, esta permanece en el organismo para siempre y no se elimina. Al tratarse de una infección que no se cura, las personas infectadas acostumbran a presentar brotes periódicos.

Las mujeres embarazadas pueden transmitir la enfermedad a su hijo. Si se adquiere el herpes genital durante el embarazo, se recomienda recibir un tratamiento adecuado para reducir el riesgo de transmisión.



02 SÍNTOMAS

Más del 50% de las personas con herpes genital no presentan síntomas o si los presentan son muy leves. Cuando se presentan los síntomas es posible que la infección haya ocurrido mucho tiempo antes, semanas, meses o incluso años antes. El signo más característico de la infección es la aparición de vesículas dolorosas en el punto de infección (vulva o vagina, pene, ano, recto o muy raramente en la boca). La sensación de hormigueo y el picor o dolor de las lesiones son también síntomas característicos. Las vesículas acaban rompiéndose, liberan líquido y pueden cicatrizar formando costras o producir lesiones ulcerativas dolorosas que tardan semanas en curarse. Es frecuente que tiempo después de curar las lesiones, reaparezcan los síntomas. A esta situación se la denomina brote.



03 DIAGNÓSTICO

En ocasiones, se puede diagnosticar observando las características de las lesiones. Lo habitual es que se tomen muestras de las vesículas o úlceras para realizar pruebas de laboratorio.




04 TRATAMIENTO

El herpes genital no se puede curar, pero algunos antivirales previenen o disminuyen la duración de los brotes y reducen las probabilidades de transmisión del virus.



05 PREVENCIÓN

El uso del preservativo disminuye el riesgo de transmisión de la infección, pero no lo elimina completamente, ya que las zonas infectadas pueden encontrarse fuera de la zona protegida por el preservativo. Se recomienda evitar las relaciones sexuales hasta que finalice el tratamiento y desaparezcan los síntomas.



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO

GOBIERNO DE CATALUÑA
AGENCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUÑA

GOBIERNO DE BARCELONA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

COLABORA

ETIS EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRASSANES



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org