

L'herpès génital est une infection sexuellement transmissible (IST) causée par le virus de l'herpès simplex de type 2 (HSV-2). Le virus de l'herpès simplex de type 1 (HSV-1) - qui affecte généralement les lèvres et les zones voisines - peut parfois affecter les zones génitales et anogénitales.

HERPÈS GÉNITAL



01 TRANSMISSION

Il peut être contracté lors de rapports sexuels anaux, vaginaux ou oraux sans préservatif, ou par contact sexuel étroit avec une personne infectée. Il peut également être transmis par des lésions cutanées muqueuses ou par des sécrétions dans lesquelles le virus est présent, même en l'absence de lésions.

Une fois que l'infection à HSV se produit, il reste dans le corps pour toujours et n'est pas éliminé. Étant une infection non guérie, les personnes infectées ont tendance à avoir des épidémies périodiques.

Les femmes enceintes peuvent transmettre la maladie à leur enfant. Si l'herpès génital est contracté pendant la grossesse, il est recommandé de suivre un traitement adéquat pour réduire le risque de transmission.



02 SYMPTÔMES

Plus de 50% des personnes atteintes d'herpès génital ne présentent aucun symptôme ou, si elles les présentent, ils sont très bénins. Lorsque les symptômes apparaissent, il est possible que l'infection se soit produite bien avant, des semaines, des mois et même des années auparavant. Le signe le plus caractéristique de l'infection est l'apparition de vésicules douloureuses au point d'infection (vulve ou vagin, pénis, anus, rectum ou très rarement dans la bouche). La sensation de picotement et la démangeaison ou la douleur des lésions sont également des symptômes caractéristiques. Les vésicules finissent par se décomposer, libérant du liquide et peuvent cicatriser en formant des croûtes ou produire des lésions ulcéreuses douloureuses qui prennent des semaines à guérir. Souvent, après la guérison des lésions, les symptômes réapparaissent. Cette situation s'appelle une épidémie.



03 DIAGNOSTIC

Parfois, il peut être diagnostiqué en observant les caractéristiques des lésions. En règle générale, des échantillons sont prélevés dans les vésicules ou les ulcères pour effectuer les tests en laboratoire.




04 TRAITEMENT

L'herpès génital ne peut pas être guéri, mais certains antiviraux préviennent ou réduisent la durée des épidémies et réduisent les risques de transmission du virus.



05 PRÉVENTION

L'utilisation du préservatif diminue le risque de transmission de l'infection, mais ne l'élimine pas complètement, car les zones infectées peuvent être en dehors de la zone protégée par le préservatif. Il est recommandé d'éviter les rapports sexuels jusqu'à la fin du traitement et la disparition des symptômes.



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL / SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y POLÍTICA FARMACÉUTICA

FOR SOLIDARIDAD / OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya / Agència de Salut Pública de Catalunya
Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS
Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COL·LABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT
TROPICAL DRABANES



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org